

Disarval D

5/160/12,5 - 10/160 /12,5

Amlodipina 5/10 mg

Valsartán 160 mg

Hidroclorotiazida 12,5 mg



Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Que contiene Disarval D?

Contiene *amlodipina*, una sustancia perteneciente a la familia de los antagonistas de los canales de calcio, *valsartán*, perteneciente a la familia de los antagonistas de los receptores de la angiotensina II, e *hidroclorotiazida*, diurético de la familia de las tiazidas. La amlodipina impide que el calcio ingrese en la pared de los vasos sanguíneos, lo que evita el estrechamiento de los mismos. El valsartán bloquea la acción que ejerce la angiotensina II (hormona que actúa sobre los vasos sanguíneos causando su estrechamiento, lo que provoca un au-

mento de la presión arterial). La hidroclorotiazida aumenta la diuresis y con ello la eliminación de agua y sodio, con lo que ayuda a bajar la presión.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Disarval D?

Disarval D está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial en adultos.

¿En qué casos no debo tomar Disarval D?

No debe tomarlo si Usted:

- Sufre alergia a la amlodipina, al valsartán, a la hidroclorotiazida o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Está cursando el segundo o tercer trimestre de embarazo.
- Está amamantando.
- Presenta problemas en el hígado.
- Presenta problemas graves en los riñones.
- Tiene en sangre niveles altos de calcio, bajos de potasio o sodio.
- Tiene niveles altos de ácido úrico con síntomas de gota.
- Tiene presión arterial baja.
- Presenta estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica) o padece insuficiencia cardíaca.
- Padece diabetes y se encuentra bajo tratamiento con aliskiren.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, Usted debe informarle si:

- Padece alguna enfermedad cardíaca o coronaria, o ha sufrido un infarto.
- Padece Lupus eritematoso sistémico.
- Ha padecido alergias y/o reacciones anafilácticas a la penicilina, sulfonamidas o a otro medicamento.
- Presenta problemas en los riñones.
- Presenta diabetes.
- Padece hiperaldosteronismo.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada, ya que el empleo de Disarval D no está recomendado durante el primer trimestre del embarazo y está contraindicado en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Disarval D puede causar severos efectos indeseables en el feto.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle, ya que el uso de Disarval D no está recomendado durante la lactancia.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con: algún otro antihipertensivo, metildopa, vasodilatadores (como diazóxido), digitálicos, antiarrítmicos, noradrenalina, adrenalina, antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, litio, carbamazepina, barbitúricos, drogas narcóticas, relajantes musculares, antiinflamatorios, corticoides, diuréticos, suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio, heparina, drogas anti-diabéticas, simvastatina, resinas de intercambio iónico (colestiramina o colestipol), medicamentos que afecten la motilidad gástrica, anticolinérgicos, anti-parkinsonianos, amantadina, ciclofosfamida, metotrexato, ciclosporina, laxantes, medicamentos para el tratamiento de la gota, sales de calcio, vitamina D, rifampicina, ritonavir.

¿En caso de tener que someterme a una intervención quirúrgica debo informar que me encuentro bajo tratamiento con Disarval D?

Sí, Ud debe informar que está tomando Disarval D.

¿Qué dosis debo tomar de Disarval D y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Como dosis orientativa se recomienda un comprimido al día, siempre a la misma hora, preferentemente por la mañana.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis?

No es necesario modificar la dosis de Disarval D si usted padece de insuficiencia renal leve a moderada.

¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?

Sí, es probable que el médico modifique la dosis.

¿Cómo debo tomar Disarval D?

Los comprimidos de Disarval D deben tomarse enteros, con agua, con o fuera de las comidas.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada de Disarval D, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del Hospital Posadas (TE 4654-6648 / 4658-7777) o del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (TE. 4962-2247/6666).

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Disarval D?

Sí, debe tener precaución con la ingesta de alcohol y jugo de pomelo, ya que su administración duran-

te el tratamiento con Disarval D puede producir un descenso marcado de la presión arterial.

¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Disarval D?

Se recomienda precaución al realizar estas actividades durante el tratamiento con Disarval D.

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Disarval D?

Como todos los medicamentos, Disarval D puede causar efectos indeseables en algunos pacientes. Los efectos indeseables más observados, incluyen: mareos, baja presión sanguínea, palpitaciones, edema, dolor de cabeza, dispepsia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, disminución del apetito, fatiga, somnolencia, espasmos musculares, dolor de espalda, rinoфарингит, tos, rash, rubor facial, urticaria, impotencia.

Si Usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Disarval D?

Debe conservarse a una temperatura no superior a los 30° C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Disarval D después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Disarval D 5/160/12,5 contiene: Amlodipina (como amlodipina besilato) 5 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, dióxido de titanio, polietilenglicol, propilenglicol, povidona, óxido férrico pardo, óxido férrico rojo,

óxido férrico amarillo.

Disarval D 10/160/12,5 contiene: Amlodipina (como amlodipina besilato) 10 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, dióxido de titanio, polietilenglicol, propilenglicol, povidona, óxido férrico pardo, óxido férrico rojo, óxido férrico amarillo.

Contenido del envase:

Disarval D 5/160/12,5: envases con 30 comprimidos recubiertos.



Comprimidos oblongos, color marrón claro, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Disarval D 10/160/12,5: envases con 30 comprimidos recubiertos.



Comprimidos oblongos, color marrón, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Para más información puede consultar el prospecto en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde ☎ 0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 57.501
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A. - Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Agosto 2014



Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires