

# Linprel Multidosis

Pregabalina 75 mg



Expendio bajo receta archivada  
Industria Argentina  
**Comprimidos birranurados**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información. Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Que contiene Linprel?

Contiene pregabalina, una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos denominados antiepilépticos.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Linprel?

Linprel está indicado para el tratamiento de:

- Dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica.
- Neuralgia postherpética.
- Adyuvante en pacientes adultos con convulsiones de inicio parcial.
- Fibromialgia.
- Ansiedad generalizada en adultos (según

criterios DSM IV).

- Dolor neuropático post-injuria espinal.

### ¿En qué casos no debo tomar Linprel?

No debe tomarlo si usted sufre alergia a la pregabalina o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Ha tenido un empeoramiento del humor depresivo o se ha sentido intranquilo, ansioso, irritable, agresivo, impulsivo.
- Tiene antecedentes de episodios de angioedema (hinchazón de la cara, boca, labios, lengua, garganta) ó está siendo tratado concomitantemente con otros medicamentos asociados a angioedema (como inhibidores de la ECA: enalapril, lisinopril).
- Se encuentra bajo tratamiento con tiazolidinodinas (como pioglitazona, rosiglitazona).
- Se encuentra bajo tratamiento con medicamentos antiespásticos (como, metocarbamol, metaxalona, orfenadrina).
- Se encuentra bajo tratamiento con drogas que potencian el estreñimiento (como analgésicos opiáceos: codeína, fentanilo).
- Padece problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca y arritmias.
- Presenta de alteraciones oculares.
- Padece dolor muscular o debilidad, en particular si se acompaña de malestar o fiebre.
- Presenta sangrado o tiene bajo recuento de plaquetas en sangre.
- Presenta problemas renales.
- Usa o ha usado drogas de abuso, o consume o ha consumido en exceso medicamentos con receta médica.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Rosiglitazona y pioglitazona (hipoglucemiantes orales).
- Oxycodona.
- Lorazepam.

### ¿Qué dosis debo tomar de Linprel y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a la indicación, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis inicial	Dosis Máxima
Fibromialgia		450 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Dolor neuropático	150 mg/día (75 mg 2 veces/día o 50 mg 3 veces/día)	Dolor neuropático asociado con neuropatía periférica diabética: 300 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
		Neuralgia postherpética: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias

Indicación	Dosis inicial	Dosis Máxima
Dolor neuropático		Dolor neuropático post-injuria espinal: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
Pacientes con convulsiones de inicio parcial	150 mg/día (75 mg 2 veces/día o 50 mg 3 veces/día)	600 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Trastorno de ansiedad generalizada en adultos		600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias

### ¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Linprel?

Sí, si usted padece de insuficiencia renal moderada o severa, es posible que el médico modifique la dosis.

### ¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Linprel?

No es necesario modificar la dosis de Linprel si usted padece de insuficiencia hepática.

### ¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis de Linprel?

Sí, en pacientes ancianos con función renal disminuida, es probable que el médico modifique la dosis.

### ¿Cómo debo tomar Linprel?

La dosis diaria indicada debe administrarse en dos a tres tomas por día, con o sin alimentos.

### ¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento de Linprel?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

**¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Linprel?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

**¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Linprel mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada de Linprel, consulte inmediatamente a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:*

(011) 4962-2247 / 4962-6666.

*Hospital Posadas:*

(011) 4654-6648 / 4658-7777.

**¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Linprel?**

Como todos los medicamentos, Linprel puede causar efectos indeseables en algunos pacientes.

Los efectos indeseables que se han observado con pregabalina incluyen: mareos, somnolencia, sequedad bucal, edema, visión borrosa, aumento de peso, trastornos del pensamiento (principalmente dificultad de concentración/atención).

Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

**¿Puedo conducir, operar maquinarias peligrosas o conducir automóviles durante el inicio del tratamiento con Linprel?**

Linprel puede causar mareos y somnolencia. Evite realizar estas actividades hasta que usted conozca cómo le afecta Linprel.

**¿Puedo consumir alcohol durante el tratamiento con Linprel?**

No tome alcohol durante el tratamiento con Linprel,

ya que puede provocar efectos indeseables.

**¿Cómo debo conservar Linprel?**

Debe conservarse a una temperatura no superior a los 30° C y protegido de la humedad.

No utilice Linprel después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Composición:**

Cada comprimido birranurado de contiene:

Pregabalina 75,0 mg

Excipientes: Starlac 100 (lactosa monohidrato: almidón de maíz), lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, óxido férrico amarillo, talco, estearato de magnesio, Prosolv HD 90 (celulosa microcristalina: dióxido de silicio coloidal), c.s.p. 1 comprimido.

**Contenido del envase:**

**Linprel Multidosis**

Envases con 15 y 30 comprimidos.



Comprimidos rectangulares, color amarillo claro, birranurados.

**“Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica, y no puede repetirse sin nueva receta médica”**

*Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Linprel en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)*

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:  0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado Nro. 54.589

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.  
Baliarda S.A.  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Enero 2016



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208707