

# Magnofen 45/135

Acido Fenofibrico  
45 mg / 135 mg



Expendio bajo receta  
Industria Argentina

**Cápsulas de liberación prolongada**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Que contiene Magnofen?

Contiene ácido fenofibrico, una sustancia perteneciente a la familia de los fibratos, que disminuye el nivel de lípidos (grasas) en la sangre y puede aumentar el nivel de "colesterol bueno" (HDL). Se utiliza junto con una dieta baja en grasas, y en ciertas circunstancias junto a otros medicamentos que también reducen las concentraciones de lípidos en sangre, denominados estatinas.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Magnofen?

Magnofen está indicado, en combinación con dieta y en algunos casos con una estatina, para disminuir los lípidos y aumentar el HDL coleste-

rol en pacientes con enfermedades del metabolismo de los lípidos.

### ¿En qué casos no debo tomar Magnofen?

No debe tomarlo si Usted:

- Es alérgico (hipersensible) al ácido fenofibrico o al fenofibrato, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Padece una enfermedad grave en los riñones o recibe diálisis.
- Padece una enfermedad o un problema persistente en el hígado.
- Padece una enfermedad en la vesícula biliar.
- Está amamantando.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, Usted debe informarle si:

- Tiene dolor, sensibilidad o debilidad muscular, como así también si usted o un familiar cercano padece de enfermedades musculares, o si usted ha tenido problemas musculares durante el tratamiento con estatinas o fibratos.
- Es diabético.
- Padece hipotiroidismo.
- Tiene problemas en los riñones.
- Tiene problemas en el hígado.
- Tiene problemas en la vesícula biliar o cálculos biliares.
- Tiene o tuvo pancreatitis (inflamación del páncreas).
- Tiene problemas con el consumo de alcohol.
- Tiene antecedentes de lesiones en la piel causadas por la luz solar o la radiación UV durante el consumo de medicamentos (fibratos, ketoprofeno).

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle, ya que el uso de Magnofen no está recomendado durante la lactancia.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Anticoagulantes.
- Resinas secuestradoras de ácido biliar.
- Inmunosupresores (por ejemplo, ciclosporina y tacrolimus).
- Colchicina.
- Beta bloqueantes, tiazidas, estrógenos, corticoides o antirretrovirales, entre otros, ya que aumentan los niveles de lípidos en sangre.
- Estatinas u otros fibratos.

### ¿Qué dosis debo tomar de Magnofen y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a las diferentes indicaciones del producto, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis
Dislipemia mixta, junto con estatinas	135 mg/día
Hipertrigliceridemia severa	45 mg/día a 135 mg/día
Hipercolesterolemia primaria o Dislipemia mixta	135 mg/día

### ¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis?

Sí, si usted padece de insuficiencia renal leve a moderada, posiblemente su médico iniciará el tratamiento con una dosis de 45 mg/día. Si usted pade-

ce insuficiencia renal severa, el uso de Magnofen no está recomendado.

**¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?**

Es probable que el médico modifique la dosis si existe un mal funcionamiento de los riñones en los pacientes ancianos. En caso contrario, no es necesario modificar la dosis.

**¿Cómo debo tomar Magnofen?**

Magnofen puede tomarse independientemente del horario de las comidas. Las cápsulas deben tragarse enteras, sin abrir, romper, disolver ni masticar. Si usted se encuentra en tratamiento junto con un medicamento de la familia de las estatinas, puede tomar ambos medicamentos al mismo tiempo.

**¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?**

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

**¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

**¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada de Magnofen, consulte a su médico. En caso de sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Pediatría R. Gutiérrez

(011) 4962-6666/2247.

**¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Magnofen?**

Como todos los medicamentos, Magnofen puede causar efectos indeseables en algunos pacientes. Los efectos indeseables observados con ácido fenofibrico incluyen: dolor musculo-esquelético, espasmos musculares, rabiomólisis (daño en los músculos), fatiga, cansancio físico y psíquico, dolor abdominal, indigestión, náuseas, constipación, diarrea, pancreatitis, dolor de cabeza, mareos, infección/inflamación en vías respiratorias, dolor faringolaringeo, tos, hepatitis, cirrosis, infección en las vías urinarias, falla renal, anemia, incrementos en valores de laboratorio de algunas enzimas hepáticas (ALT, AST, por ejemplo) o CPK. Interrumpa el tratamiento e informe a su médico inmediatamente si Ud. presenta dolor, inflamación, calambre o debilidad muscular.

**¿Cómo debo conservar Magnofen?**

Debe conservarse a una temperatura no superior a los 30° C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Magnofen después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Composición:**

**Magnofen 45**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Acido fenofibrico (como fenofibrato de colina) 45 mg  
Excipientes: hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, povidona, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, estearil fumarato de sodio, Eudragit L30D55, trietilcitrato, c.s.p. 1 cápsula.

**Magnofen 135**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Acido fenofibrico (como fenofibrato de colina) 135 mg.  
Excipientes: hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio

coloidal, povidona, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, estearil fumarato de sodio, Eudragit L30D55, trietilcitrato, c.s.p. 1 cápsula.

**Contenido del envase:**

**Magnofen 45**

Envases con 30 cápsulas de liberación prolongada.



Cápsulas de gelatina dura, tapa verde y cuerpo traslúcido conteniendo 4 microcomprimidos blancos.

**Magnofen 135**

Envases con 30 cápsulas de liberación prolongada.




Cápsulas de gelatina dura, tapa azul y cuerpo traslúcido conteniendo 12 microcomprimidos blancos.

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Magnofen en la página web de Bialarda: [www.bialarda.com.ar](http://www.bialarda.com.ar)

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o llamar a ANMAT responde:  0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el

Ministerio de Salud.

Certificado Nro. 57.386

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Bialarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Marzo de 2014



**Bialarda S.A.**

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires