

Ragipar

Rasagilina 1 mg



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos ranurados

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información. Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Ragipar?

Contiene *rasagilina*, una sustancia perteneciente al grupo de medicamentos denominados inhibidores de tipo B de la monoaminooxidasa (MAO). Actúa aumentando las concentraciones de determinadas sustancias naturales en el cerebro (como dopamina).

¿En qué pacientes está indicado el uso de Ragipar?

Ragipar está indicado para el tratamiento de los signos y síntomas de la Enfermedad de Parkinson idiopática, como monoterapia o en asociación con levodopa.

¿En qué casos no debo tomar Ragipar?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a rasagilina o cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional");
- Se encuentra o se ha encontrado bajo tratamiento con algún fármaco perteneciente a la familia de los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (como selegilina, tranilcipromina, linezolidina o azul de metileno intravenoso) en las 2 últimas semanas (en caso de dejar de tomar rasagilina, su médico le indicará cuánto tiempo debe esperar antes de comenzar a tomar un IMAO);
- Se encuentra bajo tratamiento con hierba de San Juan (hipérico), dextrometorfano, mirtazapina o clobenzaprina;
- Se encuentra bajo tratamiento con analgésicos (como meperidina, tramadol, metadona o propoxifeno).

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Presenta presión arterial elevada.
- Tiene problemas severos en el hígado.
- Presenta antecedente de pensamientos compulsivos.
- Presenta o ha presentado movimientos anormales e involuntarios (como masticación repetitiva, gesticulación facial).
- Padece lesiones cutáneas.
- Presenta hipotensión postural (desvanecimiento si se levanta demasiado rápido después de estar acostado).
- Presenta antecedentes psiquiátricos.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí. Antes de comenzar a tomar Ragipar debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Ragipar?

Se desaconseja consumir alimentos que contengan cantidades muy altas (> 150 mg) de tiramina (como quesos y nueces).

¿Puedo conducir, operar maquinarias peligrosas o conducir automóviles durante el inicio del tratamiento con Ragipar?

Ragipar puede causar somnolencia. Evite realizar estas actividades hasta que usted conozca cómo le afecta Ragipar.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con:

- Ciprofloxacina.
- Anfetaminas y antigripales (como pseudoefedrina, fenilefrina, fenilpropanolamina y efedrina).
- Fluoxetina, fluvoxamina.

¿Qué dosis debo tomar de Ragipar y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a las diferentes indicaciones, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis inicial diaria	Dosis diaria máxima
Monoterapia	1,0 mg	1,0 mg
Tratamiento adyuvante a levodopa	0,5 mg	

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Ragipar?

No es necesario modificar la dosis de Ragipar si usted padece de insuficiencia renal.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Ragipar?

Si usted padece de insuficiencia hepática leve probablemente su médico le indique una dosis diaria de 0,5 mg. No se recomienda el uso de Ragipar en pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa.

¿En los pacientes ancianos es necesario modificar la dosis?

No, en general, no es necesario modificar la dosis de Ragipar.

¿Cómo debo tomar Ragipar?

Los comprimidos deben ingerirse con o fuera de las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Ragipar?

Como todos los medicamentos, Ragipar puede causar efectos indeseables en algunos pacientes.

Los efectos indeseables que se han observado con rasagilina como monoterapia incluyen: alucinaciones, síndrome gripal, artralgia (dolor en las articulaciones), depresión y dispepsia (náuseas, pesadez y dolor de estómago después de las comidas).

Los efectos indeseables que se han observado con rasagilina como tratamiento adyuvante a levodopa incluyen: diarrea, pérdida de peso, alucinaciones, rash, disquinesia (movimientos involuntarios anormales), lesiones accidentales, pérdida de peso, hipotensión postural, vómitos, anorexia, artralgia, dolor abdominal, náuseas, constipación, sequedad bucal, tenosinovitis (inflamación de la vaina protectora de los tendones), sueños anormales, caída.

Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Puede presentarse algún otro efecto serio que requiera inmediata asistencia médica?

Sí, puede presentarse Síndrome Serotoninérgico (caracterizado por taquicardia, presión arterial lábil, mareos, sudoración excesiva, rubor, aumento de la temperatura corporal, temblor, rigidez, movimiento involuntario de los músculos, alteración de los reflejos, incoordinación, convulsiones, náuseas, vómitos, diarrea, agitación, alucinaciones, delirio, coma).

¿Cómo debo conservar Ragipar?

Debe conservarlo a una temperatura no superior a 30° C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Ragipar después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Cada comprimido ranurado contiene:

Rasagilina (como mesilato) 1 mg.

Excipientes: manitol, almidón pregelatinizado, dióxido de silicio coloidal, ácido esteárico, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:


Envases con 30 comprimidos ranurados.



Comprimidos redondos, color blanco, ranurados, codificados en una cara con "R" y "PAR" y con isotipo de identificación Baliarda en la otra cara.



Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Ragipar en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:  0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 54.704

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Julio de 2016.



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires