

## Reagin 250 / 500 / 1000

Citicolina 250 mg / 500 mg /  
1000 mg



**Baliarda**

Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Inyectable**

### FORMULA:

#### **Reagin 250**

Cada ampolla contiene: Citicolina (como Citicolina Sódica)  
250 mg. Excipientes: Agua para inyectables c.s.p. 2 ml.

#### **Reagin 500**

Cada ampolla contiene: Citicolina (como Citicolina Sódica)  
500 mg. Excipientes: Agua para inyectables c.s.p. 3 ml.

#### **Reagin 1000**

Cada ampolla contiene: Citicolina (como Citicolina Sódica)  
1000 mg. Excipientes: Agua para inyectables c.s.p. 4 ml.

### ACCION TERAPEUTICA:

Nootropo.

### INDICACIONES:

Accidente cerebrovascular. Traumatismo craneo reciente.  
Tratamiento complementario de las manifestaciones de insuficiencia vascular cerebral y de sus secuelas tanto neurológicas como aquellas referidas a la disminución del rendimiento de tipo intelectual y psíquico.

### CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS / PROPIEDADES

#### ACCION FARMACOLOGICA

La Citicolina estimula la biosíntesis de fosfolípidos estructurales de la membrana neuronal, esenciales para la integridad funcional de la membrana. Posee acción estabilizante de membrana. Incrementa la producción de acetilcolina en las neuronas colinérgicas. En situaciones de hipoxia cerebral, reduce la liberación de ácidos grasos libres y la secundaria formación de radicales libres.

#### FARMACOCINETICA:

Tras la administración parenteral la Citicolina se metaboliza a nivel celular con producción de fosforilcolina y 5'CMP. La Citicolina y sus metabolitos se distribuyen ampliamente en los distintos órganos. Mediante estudios con Citicolina marcada radiactivamente se observó la incorporación de la droga en tejido cerebral en una alta proporción, con un 62,8% de la radiactividad total formando parte de fosfolípidos

cerebrales. La eliminación por vía urinaria y fecal es muy baja, dando origen a niveles sanguíneos altos y sostenidos. Una proporción importante es eliminada por vía respiratoria como CO<sub>2</sub>. La vida media aparente es de 23.1 hs.

### POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION:

*Accidente Cerebrovascular:* 500 - 1000 mg 1 o 2 veces al día, durante 2 semanas.

*Traumatismo craneoencefálico:* 100 - 500 mg 1 o 2 veces al día, durante 2 a 4 semanas.

Dosis máxima: 2000 mg/ día.

Administrar por vía endovenosa muy lenta (3 - 5 minutos), en perfusión gota a gota (40 a 60 gotas/minuto) o por vía intramuscular.

Reagin inyectable es compatible con cualquier solución isotónica de perfusión.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del producto. Pacientes con hipertonia del parasimpático.

### ADVERTENCIAS:

En el tratamiento del accidente cerebrovascular deberá comen-  
zarse el tratamiento preferentemente antes de transcurridas 6 hs.  
En caso de hemorragia intracraneal se aconseja no superar la  
dosis de 600 mg/día.

### PRECAUCIONES:

Administrar con precaución en pacientes con trastornos de la fun-  
ción hepática

*Embarazo / Lactancia:* La inocuidad del producto durante el curso  
del embarazo y la lactancia no ha sido establecida, por lo que se  
desaconseja su utilización.

*Pacientes geriátricos:* se requiere adecuación de la dosis.

*Interacciones medicamentosas:*

La Citicolina potencia los efectos de L-Dopa, lo que puede re-  
querir ajuste de la dosis de esta droga.

Se recomienda no administrar con productos que contengan  
meclófenoxato.

### REACCIONES ADVERSAS:

El producto es bien tolerado a las dosis recomendadas. Oca-  
sionalmente pueden presentarse hipotensión y leve acción esti-  
mulante del parasimpático. Raramente puede observarse exci-  
tación o insomnio, diplopía, rash. Todas estas manifestaciones  
son reversibles y ceden al suspender la medicación.

### SOBREDOSIFICACION:

Aun no se han reportado casos en que haya habido sobredosis  
no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al  
hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:  
*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:*

(011) 4962-2247/4962-6666.

Hospital Posadas:  
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

**PRESENTACION:**

*Reagin 250 (inyectable):*

Envase con 5 ampollas.

*Reagin 500 (inyectable):*

Envase con 3 ampollas.

*Reagin 1000 (inyectable):*

Envase con 1 ampolla.

**CONSERVACION:**

Almacenar a temperatura no superior a 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

*Reagin 250 inyectable:*

Certificado N° 35701

*Reagin 500 inyectable:*

Certificado N° 37280

*Reagin 1000 inyectable:*

Certificado N° 37110

Director Técnico: Felisindo Rodríguez, Farmacéutico.

Todo tratamiento exige un control periódico, debiendo consultarse al médico ante la menor duda o efecto indeseable del medicamento.  
Siguiendo los criterios de la OMS se aconseja no administrar medicamentos durante el primer trimestre del embarazo y aún durante todo el transcurso del mismo, excepto cuando sean indicados por el médico.  
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Última revisión: Febrero 2000



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208482