

## Reagin Vascular

### Reagin Vascular 250

Citicolina sódica 100/250 mg  
Dihidroergotoxina mesilato  
4,5 mg



Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Comprimidos recubiertos ranurados**

#### INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

#### ¿Que contiene Reagin Vascular?

Contiene dos sustancias:

- Citicolina, perteneciente al grupo de los medicamentos denominados nootrópicos, que actúan mejorando el funcionamiento cerebral.
- Dihidroergotoxina, actúa sobre neurotransmisores cerebrales.

#### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Reagin Vascular?

Está indicado en pacientes con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

#### ¿En qué casos no debo tomar Reagin Vascular?

No debe tomar Reagin Vascular si Usted:

- Es alérgico (hipersensible) a citicolina, a dihidroergotoxina, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Padece hipertensión del parasimpático (un estado que se manifiesta con tensión arterial baja, sudoración, taquicardia y desmayos).
- Presenta crisis convulsivas.
- Padece psicosis aguda o crónica.
- Padece alguna enfermedad coronaria (ej. angina de pecho).
- Ha sufrido un accidente cerebrovascular.
- Presenta arteritis temporal.
- Padece problemas hepáticos graves.
- Presenta septicemia.
- Está embarazada.
- Está amamantando.

#### ¿En qué casos debo tomar Reagin Vascular con especial cuidado?

Si Usted es alérgico al ácido acetilsalicílico, el consumo de aspirina durante el tratamiento con Reagin Vascular puede provocarle broncoespasmo.

#### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

- Sí, Usted debe informarle si:
- Padece bradicardia severa.
  - Tiene problemas hepáticos o renales.

#### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo.

#### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle, ya que el uso de citicolina no está recomendado durante la lactancia.

#### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Levodopa.
- Meclofenoxato.
- Agentes antihipertensivos.
- Medicamentos que contienen nitratos.
- Inhibidores del citocromo P450 (claritromicina, eritromicina, ketoconazol, itraconazol, cimetidina, indinavir, ritonavir).

#### ¿Qué dosis debo tomar del producto y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, la dosis recomendada es 1 comprimido por día.

#### ¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

#### ¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis?

Sí, si usted padece trastornos de la función hepática, posiblemente su médico le modificará la dosis.

#### ¿Cómo debo tomar Reagin Vascular?

Los comprimidos de Reagin Vascular deben tomarse enteros, sin masticar, preferentemente con el desayuno.

No administrar en ayunas a fin de prevenir alguna clase de malestar digestivo.

#### ¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su mé-

dico le indicará como proceder de manera segura.

#### **¿Qué debo hacer si olvidó tomar una dosis?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómla tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

#### **¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:

(011) 4962-2247/4962-6666.

Hospital Posadas:

(011) 4654-6648 / 4658-7777.

#### **¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Reagin Vascular?**

Como todos los medicamentos, Reagin Vascular puede causar efectos indeseables los que generalmente son leves y poco frecuentes; incluyen: dispepsia, epigastralgia, náuseas, excitación o insomnio, diplopía, alucinaciones, dolor de cabeza, vértigo, disnea, vómitos, diarrea, rash cutáneo, rubor, urticaria, exantema, púrpura, escalofríos, edema, visión borrosa, congestión nasal, enrojecimiento de la piel, bradicardia, hipotensión ortostática, fibrosis retroperitoneal. Si se presentan estas reacciones informe a su médico inmediatamente.

#### **¿Cómo debo conservar Reagin Vascular?**

Debe conservarlo a una temperatura no superior a los 30° C. Proteger de la humedad.

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

#### **INFORMACION ADICIONAL**

##### **Composición:**

##### **Reagin Vascular:**

Cada comprimido recubierto ranurado contiene: Citicolina (como citicolina sódica) 100 mg, Dihidroergotoxina mesilato 4,5 mg.

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona, polietilenglicol 6000, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, c.s.p. 1 comprimido.

##### **Reagin Vascular 250:**

Cada comprimido recubierto ranurado contiene: Citicolina (como citicolina sódica) 250 mg Dihidroergotoxina mesilato 4,5 mg.

Excipientes: lactosa, almidón de maíz, povidona, polietilenglicol 6000, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, metilcelulosa K4M, c.s.p. 1 comprimido.

##### **Contenido del envase:**

##### **Reagin Vascular:**

Envases con 20 y 30 comprimidos recubiertos ranurados.



Comprimidos redondos, color blanco, ranurados.

##### **Reagin Vascular 250:**

Envases con 20 comprimidos recubiertos ranurados.



Comprimidos redondos, color blanco, ranurados.

Para más información puede consultar el prospecto de Reagin Vascular en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o llamar a ANMAT responde: ☎ 0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el  
Ministerio de Salud.

Certificado Nro. 35.701

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Mayo 2015



**Baliarda S.A.**

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208620