

Hemovit

Hierro polimaltosato
Ácido fólico
Vitamina B₁₂



Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Hemovit?

Hemovit contiene hierro, ácido fólico y vitamina B₁₂, tres elementos esenciales para la normal eritropoyesis (generación de los glóbulos rojos).

¿En qué pacientes está indicado el uso de Hemovit?

Hemovit está indicado para el tratamiento y la prevención de la anemia por déficit combinado de hierro, ácido fólico y vitamina B₁₂.

¿En qué casos no debo tomar Hemovit?

No debe tomarlo si usted:
- es alérgico o presenta intolerancia al hierro o a cualquiera de los componentes del producto

(ver "Información adicional").

- padece anemia sin ferropenia comprobada (como anemia hemolítica, trastornos de la eritropoyesis, hipoplasia medular).
- sufre de trastornos en la utilización del hierro (como anemia sideroblástica, talasemia, anemia secundaria a intoxicación por plomo, porfiria cutánea tarda).
- presenta una sobrecarga de hierro (como hemocromatosis, hemosiderosis).
- tiene infecciones agudas.
- presenta problemas hepáticos severos.
- padece Enfermedad de Leber en el estadio precoz.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- presenta oscurecimiento de las heces.
- recibe transfusiones sanguíneas periódicas.
- presenta o tiene antecedentes de afecciones en el tracto digestivo (como úlcera gastroduodenal, enfermedades inflamatorias intestinales, malabsorción intestinal).
- tiene o ha tenido problemas con el consumo de alcohol.
- presenta problemas agudos en los riñones.
- está bajo tratamiento con formulaciones parenterales que contienen hierro.
- presenta un tumor maligno.
- sufre de psoriasis.
- presenta anemia perniciosa.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí. Antes de comenzar a tomar Hemovit debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.
Hemovit debe ser administrado con precaución durante la lactancia.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con cimetidina, deferoxamina, tetraciclinas (como doxiciclina), etidronato, fluoroquinolonas (como ciprofloxacina), penicilamina, antiácidos, colestiramina, antagonistas de folatos (como trimetoprima, tetroxoprima, proguanil, cicloguanil, pirimetamina, metotrexato, aminopterina, triamtereno), fenobarbital, fenitoína, primidona, vitamina C (ácido ascórbico), penicilamina, cloranfenicol, corticoides, aminosalicilatos (como sulfasalazina), colchicina (especialmente en combinación con aminoglucósidos, como gentamicina), levotiroxina, estrógenos (anti-conceptivos), sulfamidas (sulfadiazina).

¿Qué dosis debo tomar de Hemovit y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.
Para su información, las dosis orientativas son:
Adultos: 1 a 2 comprimidos/día.

¿Cómo debo tomar Hemovit?

Los comprimidos de Hemovit deben tomarse durante o inmediatamente después de las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento de Hemovit?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Hemovit?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Hemovit mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada de Hemovit, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Hemovit?

Los suplementos de calcio (fosfato o carbonato); café; huevos; alimentos que contengan carbonatos, bicarbonatos, fosfatos, oxalatos; productos lácteos; té; pan integral o cereales integrales; alimentos ricos en fibra, pueden disminuir la absorción de hierro por formación de complejos poco solubles o insolubles. Se recomienda administrar el producto al menos 1 hora antes o 2 horas después de la ingestión de cualquiera de los productos mencionados.

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Hemovit?

Como todos los medicamentos, Hemovit puede causar efectos indeseables en algunos pacientes.

Los efectos indeseables que se han observado con hierro, ácido fólico y vitamina B₁₂ con frecuencia incluyen: dolor o calambres abdominales, reacciones alérgicas (eritema, rash dérmico, prurito, broncoespasmo) y trastornos gastrointestinales (constipación,

diarrea, náusea, vómitos, sensación de plenitud, presión en la región epigástrica).

Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Hemovit?

Hemovit debe conservarse a una temperatura no superior a 30° C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Hemovit después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Hierro (como hierro polimaltosato) 100,0 mg, Acido fólico 0,5 mg, Vitamina B₁₂ (como cianocobalamina) 0,2 mg.

Excipientes: estearato de magnesio, povidona, talco, propilenglicol, dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelulosa, croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina silicificada (celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal), polietilenglicol 6000, dióxido de silicio coloidal, laca rojo punzó, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:

Envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos.




Comprimidos redondos, color rojo, codificados en una cara con isotipo de identificación Baliarda.

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contra-indicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Hemovit en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a

ANMAT responde:  0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 54.110

Director Técnico: Alejandro Hermann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Marzo 2016

 **Baliarda S.A.**
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208740