

Ilduc 5/10

Amlodipina 5/10 mg



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos ranurados

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información. Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas. Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Ilduc?

Contiene *amlodipina*, una sustancia perteneciente a la familia de los antagonistas de los canales de calcio.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Ilduc?

Ilduc está indicado para el tratamiento de:

- Hipertensión arterial
- Angina crónica estable o angina vasoespástica (angina variante o de Prinzmetal)
- Arteriopatía coronaria

¿En qué casos no debo tomar Ilduc?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a amlodipina o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Padece angina inestable (excluida la angina de Prinzmetal).
- Tiene presión arterial extremadamente baja.
- Está embarazada.
- Está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si padece:

- Estrechamiento de la válvula aórtica (estenosis aórtica).
- Problemas hepáticos.
- Alguna enfermedad cardíaca (como insuficiencia cardíaca congestiva).

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando. En especial infórmele si está bajo tratamiento con:

- Algún otro antihipertensivo (como diltiazem)
- Anticonvulsivantes (como carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona)
- Antimicóticos (como ketoconazol, itraconazol)
- Antirretrovirales (como ritonavir)
- Antibióticos (como rifampicina)
- Hierba de San Juan
- Ciclosporina
- Dantrolene
- Simvastatina
- Sildenafil

¿Qué dosis debo tomar de Ilduc y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, las dosis orientativas son:

Adultos		
Indicación	Dosis inicial	Dosis recomendada
Hipertensión	5 mg/día	5-10 mg/día
Angina crónica estable o vasoespástica	5 mg/día	5-10 mg/día
Arteriopatía coronaria	5 mg/día	5-10 mg/día
Niños de 6-17 años		
Indicación	Dosis inicial	Dosis recomendada
Hipertensión	2,5 mg/día	2,5-5 mg/día

¿En pacientes de bajo peso, debilitados o de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Ilduc?

Sí, es probable que usted requiera una dosis inicial menor.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Ilduc?

Sí, es probable que usted requiera una dosis inicial menor.

¿Cómo debo tomar Ilduc?

Se recomienda tomar Ilduc a la misma hora todos los días, con o fuera de las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Ilduc?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Ilduc?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Ilduc mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada de producto consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247/4962-6666

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Ilduc?

Sí, debe tener precaución con el consumo de pomelo y jugo de pomelo, ya que su ingesta durante el tratamiento con Ilduc puede producir un descenso marcado de la tensión arterial.

¿Puedo conducir, operar maquinarias o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Ilduc?

Dado que amlodipina puede causar cefalea, fatiga, náuseas, somnolencia, o afectar su habilidad para pensar claramente o reaccionar rápidamente, evite realizar estas actividades hasta que usted conozca cómo le afecta Ilduc.

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Ilduc?

Como todos los medicamentos, Ilduc puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas que se han observado con amlodipina incluyen: edema, cefalea, mareo, eritema, palpitaciones, fatiga, náuseas, dolor abdominal, somnolencia.

Se han notificado casos de ictericia y elevación de las enzimas hepáticas.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Ilduc?

Debe conservarlo a temperatura no superior a 30°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Ilduc después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Ilduc 5

Cada comprimido ranurado contiene:

Amlodipina besilato (equivalente a 5 mg de amlodipina) 6,93 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina silicificada, fosfato de calcio dibásico dihidrato, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, c.s.p. 1 comprimido.

Ilduc 10

Cada comprimido ranurado contiene:


Amlodipina besilato (equivalente a 10 mg de amlodipina) 13,86 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina silicificada, fosfato de calcio dibásico dihidrato, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:


Ilduc 5

Envases conteniendo 30 comprimidos ranurados.

 Comprimidos oblongos, monorranurados, color blanco, codificados en una cara con "IL" y "5".


Ilduc 10

Envases conteniendo 30 comprimidos ranurados.

 Comprimidos oblongos, trirranurados, color blanco, codificados en una cara con "IL" y "10".

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Ilduc en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 **4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 49.183

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.



Este Medicamento es Libre de Gluten

Última revisión: Enero 2015



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires