

Pantusec 20/40

Pantoprazol magnésico
20/40 mg



Baliarda

Expendio bajo receta

Industria Argentina

Comprimidos recubiertos gastroresistentes

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.

Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si tiene cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Pantusec?

Contiene pantoprazol, una sustancia perteneciente a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones, que disminuye la cantidad de ácido producido por el estómago.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Pantusec?

Úlcera duodenal. Úlcera gástrica. Esofagitis por reflujo gastroesofágico. Síndrome de Zollinger - Ellison y otras condiciones hipersecretorias patológicas de ácido clorhídrico. Erradicación de *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) en combinación con terapia antibiótica adecuada en pacientes con *H.pylori* asociado a úlceras.

¿En qué casos no debo tomar Pantusec?

No debe tomarlo si usted:

-Es alérgico (hipersensible) al pantoprazol o a fármacos similares (como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol) o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").

-Está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Tiene o ha tenido recientemente alguno de los siguientes síntomas: pérdida de peso involuntaria, vómitos, vómito de sangre, heces oscuras o sangre en las deposiciones, anemia, o dificultad para tragar.

- Tiene diarrea severa y/o persistente, ya que los medicamentos que reducen el nivel de ácido en el estómago están asociados a un pequeño aumento de la frecuencia de diarrea infecciosa.

- Se le ha diagnosticado malabsorción de vitamina B₁₂ o tiene reservas corporales de vitamina B₁₂ disminuidas o factores de riesgo para ello. Como todos los medicamentos que reducen la cantidad de ácido, pantoprazol podría reducir la absorción de vitamina B₁₂ luego de un tratamiento prolongado.

- Tiene problemas severos en el hígado.

- Tiene o ha tenido bajos niveles de magnesio en la sangre.

- Tiene trastornos gastrointestinales pasajeros (como trastornos gástricos de origen psicossomático).

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tra-

tamiento con ciertos medicamentos como:

- Otro inhibidor de la bomba de protones (como omeprazol, esomeprazol) hace más de un año, especialmente si usted es mayor de 50 años, ya que podría aumentar ligeramente el riesgo de fractura de cadera, muñeca o columna vertebral. Por tal motivo, los pacientes deberían usar la menor dosis, durante el menor tiempo, de acuerdo a la patología por la cual sea tratado.

- Medicamentos para el HIV (como atazanavir, ritonavir).

- Ketoconazol o itraconazol, sales de hierro (como sulfato de hierro), ciertos antibióticos (como ampicilina), y/o metotrexato.

- Anticoagulantes cumarínicos (como warfarina).

- Digoxina o medicamentos que puedan disminuir los niveles de magnesio en sangre (diuréticos: furosemida, hidroclorotiazida).

¿Qué dosis debo tomar de Pantusec y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a las diferentes indicaciones del producto, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis	Dosis máxima
Formas leves de reflujo gastroesofágico	20 mg/día	40 mg/día
Úlcera gástrica	40 mg/día	80 mg/día
Úlcera duodenal		
Formas moderadas a severas de esofagitis por reflujo gastroesofágico	40 mg/día	240 mg/día
Síndrome de Zollinger-Ellison y condiciones hipersecretorias de ácido clorhídrico		

Erradicación de *H. pylori* (para reducir el riesgo de recurrencia de úlcera duodenal):

Los regímenes alternativos (o uno u otro) de triple terapia recomendados son:

- Claritromicina + metronidazol + pantoprazol.

- Claritromicina + amoxicilina + pantoprazol.

- Amoxicilina + metronidazol + pantoprazol.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis?

Sí, si usted padece de insuficiencia renal, posiblemente su médico le modificará la dosis.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis?

Sí, si usted padece de insuficiencia hepática severa, posiblemente su médico le modificará la dosis.

¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?

Sí, es probable que el médico modifique la dosis.

¿Cómo debo tomar Pantusec?

Los comprimidos deben tomarse enteros, sin masticar, antes, durante o después del desayuno, con suficiente cantidad de agua.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento de Pantusec?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvidó tomar una dosis de Pantusec?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Pantusec mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Pantusec?

Como todos los medicamentos, Pantusec puede causar efectos indeseables en algunos pacientes. Los efectos indeseables más frecuentes observados con el uso de pantoprazol incluyen: dolor de cabeza, diarrea, síndrome gripal, náusea.

Otros efectos indeseables observados con menor frecuencia fueron: aumento de la presión arterial, flatulencia, constipación, dolor y molestia abdominal, reflujo gastroesofágico agravado, vómitos, eructos, pérdida del apetito, aumento de peso, hemorroides, ansiedad, dolor de espalda, dolor de pecho, dolor de cuello, artralgia, dolor en las extremidades, osteoporosis, osteoporosis asociada a fracturas, mareo, vértigo, visión borrosa, boca seca, trastornos del sueño, calambres musculares, aumento de la frecuencia urinaria, prurito, rash, fatiga y malestar.

Si usted presenta cualquier otro efecto adverso no mencionado aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar los comprimidos de Pantusec?

Debe conservarse a una temperatura no superior a los 30° C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Pantusec 20:

Cada comprimido recubierto gastroresistente contiene: Pantoprazol magnésico dihidrato (equivalente a pantoprazol 20 mg) 21,52 mg.

Excipientes: carbonato de sodio, povidona, manitol, crospovidona, estearato de magnesio, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, propilenglicol, dióxido de titanio, Eudragit L30D55, trietilcitrate, laurilsulfato de sodio, laca amarillo de quinolina, laca azul brillante, vainillina, c.s.p. 1 comprimido.

Pantusec 40:

Cada comprimido recubierto gastroresistente contiene: Pantoprazol magnésico dihidrato (equivalente a pantoprazol 40 mg) 43,04 mg.

Excipientes: carbonato de sodio, povidona, manitol, crospovidona, estearato de magnesio, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, propilenglicol, dióxido de titanio, Eudragit L30D55, trietilcitrate, laurilsulfato de sodio, óxido férrico amarillo, óxido férrico pardo, óxido férrico rojo, vainillina, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:

Pantusec 20:

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos gastroresistentes.



Comprimidos oblongos, de color verde claro con aroma a vainilla.

Pantusec 40:

Envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos gastroresistentes.



Comprimidos oblongos, de color rosa claro con aroma a vainilla.

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Pantusec en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: ☎ 0800-333-1234.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 56.277

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Octubre de 2016.



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires