

Tunik 100 B₁₂

Adenosil Metionina 100 mg
Vitamina B₁₂ 5 mg



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Inyectable intramuscular

FORMULA:

Cada frasco ampolla liofilizado contiene:
Adenosil Metionina (como disulfato, di p. toluensulfonato) 100 mg, vitamina B₁₂ 5 mg.
Excipientes: manitol, c.s.p. 1 frasco ampolla liofilizado.
Cada ampolla solvente contiene:
Clorhidrato de lidocaína, fosfato monosódico anhidro, fosfato trisódico anhidro, agua para inyectables, c.s.p. 5 ml.

ACCION TERAPEUTICA:

Normalizador de los procesos fisiológicos de transmisión y transulfuración.

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de la artrosis primaria y secundaria.
Hepatopatías agudas y crónicas.
Hepatitis. Cirrosis. Hepatopatías medicamentosas.
Síndrome depresivo.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION:

En artrosis:

Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular 3 veces por semana, durante 6 a 8 semanas.

Dosis máxima: 2 frascos ampolla 3 veces por semana.
Repetir el tratamiento 2-3 veces al año según criterio médico.

En fibromialgia y cuadros depresivos:

Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular por día, durante 30 días. Repetir el tratamiento según criterio médico.

Dosis máxima: 1 frasco ampolla 2 veces por día.

En hepatopatías:

Dosis habitual: 1 frasco ampolla por vía intramuscular por día, durante 30 a 45 días. Repetir el tratamiento según criterio médico.

Dosis máxima: 2 frascos ampolla diarios (en una sola aplicación).



El liofilizado debe disolverse solamente en el solvente que lo acompaña y en el momento de su utilización. La ampolla solvente sólo debe ser aplicada a la disolución del liofilizado de Tunik 100 B₁₂.

Por exposición prolongada al calor o por microrrotura del frasco cambia la coloración del liofilizado a marrón oscuro; se aconseja no utilizarlo en estas condiciones.

CONTRAINDICACIONES:

No debe administrarse a pacientes con manía o hipomanía, con feocromocitoma, con insuficiencia renal, ni en pacientes hipersensibles a sus principios activos. No administrar a embarazadas ni a madres que amamanten.

REACCIONES ADVERSAS:

En pacientes sensibles pueden presentarse náuseas y vómitos. Con dosis elevadas puede aparecer ligera excitación.

SOBREDOSIFICACION:

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:

Hospital Posadas

(11) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(11) 4962-2247 / 6666

PRESENTACION:

Envases con 5 frascos ampolla liofilizados y 5 ampollas solvente.

CONDICIONES DE CONSERVACION:

Mantener a temperatura no superior a 30° C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 37.418

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Todo tratamiento exige un control periódico, debiendo consultarse al médico ante la menor duda o efecto indeseable del medicamento. Siguiendo los criterios de la OMS se aconseja no administrar medicamentos durante el primer trimestre del embarazo y aún durante todo el transcurso del mismo, excepto cuando sean indicados por el médico. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ultima revisión: Enero 1996



Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208375