

# Alertial 120

FEFOXENADINA CLORHIDRATO  
120 mg

## Baliarda

Venta Libre  
Industria Argentina

Vía de administración: ORAL  
Comprimidos recubiertos

### INFORMACION PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

#### ¿Qué contiene Alertial 120?

Cada comprimido recubierto contiene:

Ingrediente activo: Fexofenadina clorhidrato 120 mg.

Ingredientes inactivos (excipientes): almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol 6000, povidona, laca azul brillante.

#### Acción:

Antialérgico no sedativo.

#### ¿Para qué se usa Alertial 120?

Se utiliza en adultos y adolescentes a partir de 16 años, para aliviar los síntomas:

- asociados a rinitis alérgica (como estornudos,

picação de ojos y/o nariz, secreción nasal, congestión nasal, enrojecimiento y lagrimeo de ojos).

- de picação (prurito), ronchas de la piel y sarpullidos.

#### ¿Qué personas no pueden recibir Alertial 120?

No tome este medicamento si usted tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

#### ¿Qué cuidados debe tener antes de tomar Alertial 120?

Si usted tiene problemas en el hígado o en los riñones consulte a su médico antes de tomarlo.

Si usted tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, podría aumentar el riesgo de latidos rápidos e irregulares.

**Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o amamantando a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

Efectos sobre la capacidad de conducir: es poco probable que los comprimidos de Alertial 120 afecten su capacidad para conducir o utilizar maquinaria. Sin embargo, deberá comprobar que Alertial 120 no le produzcan sueño o mareo al momento de conducir o utilizar maquinaria.

#### ¿Qué cuidados debe tener mientras está tomando Alertial 120?

Al igual que todos los medicamentos, Alertial 120 puede producir reacciones adversas.

Consulte con su médico inmediatamente y deje de tomar Alertial 120 si nota que:

- se le hincha la cara, los labios, la lengua o la garganta y tiene dificultad para respirar (pueden ser síntomas de una reacción alérgica).

*Reacciones adversas frecuentes:*

- Dolor de cabeza.
- Somnolencia.
- Sensación de malestar (náuseas).
- Mareo.

*Reacciones adversas poco frecuentes:*

- Cansancio.

*Otras reacciones adversas que pueden ocurrir:*

- Dificultad para dormir (insomnio).
- Trastornos del sueño.
- Pesadillas.

- Nerviosismo.
- Latido del corazón rápido o irregular.
- Diarrea.
- Erupción en la piel y picazón.
- Urticaria.
- Reacciones alérgicas graves que pueden manifestarse como inflamación de la cara, labios, lengua o garganta, sofoco, opresión en el pecho, y dificultad para respirar. Si usted toma al mismo tiempo medicamentos para la indigestión que contienen aluminio y magnesio, estos pueden afectar la acción de Alertial 120 disminuyendo la cantidad de medicamento absorbido.

**Se recomienda dejar un intervalo de unas 2 horas entre la toma de Alertial 120 y la del medicamento para la indigestión.**

**SI LOS SINTOMAS DE RINITIS PERSISTEN POR MAS DE 7 DIAS O EMPEORAN, CONSULTE A SU MEDICO.**

### **¿Cómo se usa Alertial 120?**

*Adultos y adolescentes a partir de 16 años:* la dosis recomendada es 120 mg/día (1 comprimido por día), antes de las comidas, con agua.

**No se ha determinado su uso para menores de 16 años.**

Si olvidó tomar Alertial 120, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la siguiente dosis a la hora habitual indicada por su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACION CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA:

*Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:  
0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247*

*Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:  
(011) 4654-6648 / 4658-7777*

*Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:  
(011) 4808-2655 / 4801-7767*

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

### **¿Tiene usted alguna pregunta?**

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:

 **4122-5818**

También puede llamar a ANMAT RESPONDE:

 **0800-333-1234**

### **PRESENTACION**

#### **Alertial 120:**

Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.



Comprimidos oblongos ranurados de color celeste con el isotipo de identificación Baliarda en una cara y la inscripción "ALERTIAL" en la otra.

### **Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.**

Mantener a temperatura no superior a 30°C.  
Proteger de la humedad.

Especialidad medicinal autorizada  
por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 54.736

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.  
Baliarda S.A. Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.



Última revisión: Enero de 2025



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires