

# Venlifax XR 37,5/75/150

Venlafaxina  
37,5/75/150 mg



Expendio bajo receta archivada (Lista IV)  
Industria Argentina  
**Cápsulas de liberación prolongada**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información. Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas. Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave, o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Qué contiene Venlifax XR?

Contiene *venlafaxina*, una sustancia perteneciente a la familia de los antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRSN).

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Venlifax XR?

Venlifax XR está indicado para el tratamiento de:

- Trastorno depresivo mayor (DSM IV).
- Trastorno de ansiedad generalizada (DSM IV).
- Trastorno de ansiedad social (fobia social) (DSM IV).
- Trastorno de pánico con o sin agorafobia (DSM IV).

### ¿En qué casos no debo tomar Venlifax XR?

No debe tomar Venlifax XR si usted:

- Es alérgico a venlafaxina, a desvenlafaxina o a cualquiera de los componentes del producto (ver "Información adicional").

- Se encuentra o se ha encontrado recientemente bajo tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa (como isocarboxazida, selegilina, moclobemida).

No debe ser administrado en menores de 18 años.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Padece glaucoma de ángulo cerrado.
- Padece o tiene antecedentes de hipertensión, alguna enfermedad cardíaca o enfermedad cerebrovascular.
- Padece o ha padecido convulsiones o crisis epilépticas.
- Presenta manía o hipomanía (estado anormal de agitación, actividad exagerada con o sin delirio).
- Tiene problemas de dependencia al alcohol o sustancias de abuso.
- Padece diabetes.
- Presenta bajos niveles de sodio en sangre asociados a los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, alteración de la memoria, confusión, debilidad e inestabilidad, síncope (pérdida breve de la conciencia).
- Presenta tendencia al sangrado.
- Tiene o ha tenido niveles altos de colesterol en sangre.
- Presenta problemas respiratorios (como tos, falta de aire, malestar en el pecho).
- Presenta riesgo de fracturas óseas.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo, o si planeo quedar embarazada?

Antes de comenzar a tomar Venlifax XR, debe informarle a su médico si está embarazada, presume estarlo o si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

### ¿Es importante que informe a mi médico si he padecido otras enfermedades?

Sí, infórmele especialmente si presenta antecedentes personales o familiares de alguna enfermedad psiquiátrica (como trastorno bipolar, depresión) o de suicidio.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante ya que venlafaxina, puede afectar la acción y depuración de otros medicamentos y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial infórmele si está bajo tratamiento con: triptanos (como sumatriptán), antipsicóticos (como pimozida), antidepresivos (como desipramina, imipramina, nortriptilina, clomipramina, fluoxetina, escitalopram, sertralina), fentanilo, litio, tramadol, triptófano, buspirona, anfetaminas, hierba de San Juan, linezolid, diazepam, haloperidol, cimetidina, hipoglucemiantes (como insulina, metformina), antihipertensivos (como atenolol, carvedilol, furosemida, hidroclorotiazida, enalapril, verapamilo), antibióticos (como claritromicina, levofloxacina), eritromicina, fluconazol, ketoconazol, AINEs, aspirina, warfarina u otros fármacos que afecten la función plaquetaria.

### ¿Qué dosis debo tomar de Venlifax XR y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado. Su médico decidirá su dosis inicial. La dosis de mantenimiento (dosis diaria) dependerá de su enfermedad y de sus necesidades, y podrá variar entre 75 - 225 mg/día.

### ¿Si padezco problemas de riñón o hígado, es necesario modificar la dosis?

Sí, es posible que su médico le indique una dosis menor.

### ¿En los pacientes de edad avanzada es necesario modificar la dosis?

No, no es necesario modificar la dosis en pacientes de edad avanzada.

### ¿Cómo debo tomar Venlifax XR?

Venlifax XR debe administrarse en una sola toma diaria con el desayuno o la cena, aproximadamente a la misma hora todos los días. Las cápsulas deben ingerirse enteras, con líquido suficiente y no deben ser partidas, masticadas, ni disueltas en agua. Como modo alternativo de administración, se recomienda abrir cuidadosamente las cápsulas y volcar el contenido en una cuchara sopera con compota de manzana. Tragar inmediatamente sin masticar los microgránulos, seguido de un vaso de agua para asegurar la completa ingestión de los mismos.

### ¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Venlifax XR?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura. En general la dosis debe reducirse gradualmente para evitar efectos no deseados (efectos de retirada). No deje de tomar Venlifax XR repentinamente sin haber hablado con su médico.

### ¿Qué debo hacer si olvidó tomar una dosis de Venlifax XR?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

### **¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Venlifax XR mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

### **¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Venlifax XR?**

Evite comer pomelo o tomar jugo de pomelo durante el tratamiento con Venlifax XR.

### **¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Venlifax XR?**

Debido a que venlafaxina puede alterar su capacidad de reacción, evite realizar estas actividades hasta saber cómo le afecta el producto.

### **¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Venlifax XR?**

Como todos los medicamentos Venlifax XR puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia con venlafaxina incluyen: náuseas, sequedad bucal, dolor de cabeza, sudoración, insomnio, mareo, sedación, constipación, fatiga, astenia (debilidad generalizada), pérdida o aumento de peso, aumento del colesterol sanguíneo.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

### **¿Qué debo hacer si mi estado de ánimo empeora?**

Consulte inmediatamente a su médico si usted nota un empeoramiento de sus síntomas: experimen-

ta preocupación extrema, inquietud, dificultad para dormir o permanecer dormido, presenta un comportamiento agresivo, irritabilidad, impulsividad, o piensa en hacerse daño.

Asegúrese que sus familiares o la persona encargada de cuidarlo conozcan estos síntomas, de modo que puedan llamar al médico si usted no puede buscar ayuda por sí mismo.

### **¿Pueden aparecer efectos no deseados después de interrumpido el tratamiento?**

La interrupción demasiado rápida del tratamiento puede causar cambios en su estado de ánimo, nerviosismo, agitación, ansiedad, confusión, anorexia, trastornos de coordinación, diarrea, náuseas, vómitos, mareo, sequedad bucal, síntomas gripales, sudoración, dolor de cabeza, dificultad para dormir, cansancio, somnolencia, pesadillas.

### **¿Puede presentarse alguna otra reacción adversa seria?**

Sí, puede presentarse síndrome serotoninérgico, que requiere inmediata asistencia médica. Los síntomas del síndrome serotoninérgico pueden incluir: agitación, alucinaciones, latidos rápidos del corazón, cambios rápidos en la presión arterial, mareo, rubor, aumento de la temperatura corporal, temblor, rigidez, movimientos musculares involuntarios, reflejos hiperactivos, pérdida de la coordinación, náuseas, vómitos, diarrea.

### **¿Cómo debo conservar Venlifax XR?**

Debe conservarse a temperatura ambiente no superior a 30°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

## **INFORMACION ADICIONAL**

### **Composición:**

#### **Venlifax XR 37,5:**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Venlafaxina (como venlafaxina clorhidrato) 37,5 mg. Excipientes: esferas de azúcar, povidona, etilcelulosa, triglicéridos de cadena media, talco, c.s.p. 1 cápsula.

#### **Venlifax XR 75:**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Venlafaxina (como venlafaxina clorhidrato) 75 mg. Excipientes: esferas de azúcar, povidona, etilcelulosa, triglicéridos de cadena media, talco, c.s.p. 1 cápsula.

#### **Venlifax XR 150:**

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Venlafaxina (como venlafaxina clorhidrato) 150 mg. Excipientes: esferas de azúcar, povidona, etilcelulosa, triglicéridos de cadena media, talco, c.s.p. 1 cápsula.

### **Contenido del envase:**

#### **Venlifax XR 37,5:**

Envases con 14 cápsulas de liberación prolongada.

 Cápsulas de gelatina verde, codificadas con isotipo de identificación Baliarda y VX R 37,5 en color negro.

#### **Venlifax XR 75:**

Envases con 28 cápsulas de liberación prolongada.

 Cápsulas de gelatina verde, codificadas con isotipo de identificación Baliarda y VX R 75 en color negro.

#### **Venlifax XR 150:**

Envases con 28 cápsulas de liberación prolongada.

 Cápsulas de gelatina verde, codificadas con isotipo de identificación Baliarda y VX R 150 en color negro.

**“Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica, y no puede repetirse sin nueva receta médica”.**

*Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Venlifax XR en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar).*

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar>. asp o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

 4122-5818

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 50.611

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires



Este Medicamento es Libre de Gluten

Ultima revisión: Mayo 2018.



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires