

Baliartrin Duo

Glucosamina sulfato
Condroitín sulfato sódico



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos
Granulado

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda **CONSULTE A SU MEDICO**. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que algunas de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, **INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO**.

¿Que contiene Baliartrin Duo?

Contiene:

- *glucosamina sulfato*, componente natural del organismo humano, que participa como sustrato esencial en la biosíntesis de componentes del cartílago articular y del líquido sinovial.
- *condroitín sulfato*, presente en forma natural en el cartílago articular, es un componente fundamental para asegurar la movilidad articular debido a su capacidad de retención de agua y nutrientes esenciales.

Ambos principios activos se encuentran en déficit en las articulaciones artrósicas.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Baliartrin Duo?

Baliartrin Duo está indicado en artrosis primaria y secundaria, osteocondrosis, espondilosis, condromalacia de la rótula y periartritis escapulohumeral.

¿En qué casos no debo tomar Baliartrin Duo?

No debe tomarlo si usted:

- es alérgico (hipersensible) a la glucosamina, a sulfatos, a condroitín, a crustáceos o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- presenta problemas renales severos.
- está embarazada.
- se encuentra amamantando.

No debe ser administrado en menores de 18 años.

Baliartrin Duo (granulado) no deben ser administrados en pacientes con fenilcetonuria, debido a que contiene aspartamo, fuente de fenilalanina.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- padece asma.
- presenta algún problema en la coagulación de la sangre.
- padece o tiene antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular (como insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, eventos tromboticos cardiovasculares serios) o presenta factores de riesgo (como diabetes mellitus, presión arterial elevada, colesterol elevado, tabaquismo).
- tiene tolerancia alterada a la glucosa.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante ya que los principios activos del producto pueden afectar la acción y depuración de otros medicamentos y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial infórmele si está bajo tratamiento con anticoagulantes (como warfarina, dicumarol, fenprocumón, acenocumarol y fluindiona), algunos antibióticos (como tetraciclina, cloranfenicol o penicilina).

¿Qué dosis debo tomar de Baliartrin Duo y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Como dosis orientativas, se recomienda:

Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos): 1 comprimido 2 a 3 veces al día, con las comidas.

Baliartrin Duo (granulado): 1 sobre una vez al día, con las comidas.

¿Cómo debo tomar Baliartrin Duo?

Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos): los comprimidos deben ingerirse con abundante agua y junto con las comidas.

Baliartrin Duo (granulado): vaciar el contenido del sobre en un vaso de agua y agitar hasta su completa disolución. Ingerir junto con las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Baliartrin Duo?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Baliartrin Duo?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómelas tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Baliartrin Duo mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 46587777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Baliartrin Duo?

Como todos los medicamentos, Baliartrin Duo puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas más frecuentes observadas con el uso de glucosamina fueron: náuseas, pesadez y dolor abdominal, meteorismo, constipación, diarrea, dolor de cabeza, cansancio generalizado, vómitos, erupción, picazón, enrojecimiento.

La reacción adversa observada excepcionalmente en pacientes con insuficiencia renal y/o cardíaca con el uso de condroitín sulfato fue edema (retención de líquido).

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Baliartrin Duo?

Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos):

Mantener a temperatura no superior a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

Baliartrin Duo (granulado):

Mantener a temperatura no superior a 30°C. Proteger de la humedad.

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos):

Cada comprimido recubierto contiene:

Glucosamina sulfato (como glucosamina sulfato poliacristalino) 500 mg; Condroitín sulfato sódico 400 mg. Excipientes: lauril sulfato de sodio, Cellactose 80 (lactosa + polvo de celulosa), povidona, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, propilenglicol, talco, dióxido de titanio, laca amarillo ocaso, laca amarillo de quinolina, c.s.p. 1 comprimido.

Baliartrin Duo (granulado):

Cada sobre contiene:

Glucosamina sulfato (como glucosamina sulfato poliacristalino) 1500 mg; Condroitín sulfato sódico 1200 mg. Excipientes: sacarina sódica, aspartamo, ciclamato sódico, amarillo ocaso, amarillo de quinolina, polietilenglicol 6000, povidona, bicarbonato de sodio, ácido cítrico, esencia de naranja en polvo, c.s.p. 1 sobre.

Contenido del envase

Baliartrin Duo (comprimidos recubiertos):

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

 Comprimidos oblongos, de color naranja.

Baliartrin Duo (granulado):

Envase conteniendo 30 sobres.

 Granulado, de color naranja, con aroma a naranja.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Baliartrin Duo en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 4122-5818

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.887.

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.



Este Medicamento es Libre de Gluten

Última revisión: Enero 2020



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires