

Reagin

Reagin 250/500/1000

Citicolina 100 mg/ml

Citicolina

250/500/1000 mg



Baliarda

Expendio bajo receta

Industria Argentina

Gotas

Comprimidos recubiertos ranurados

Granulado para solución oral

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Regain?

Contiene citicolina, una sustancia perteneciente al grupo de los medicamentos denominados nootrópicos, que actúan mejorando el funcionamiento cerebral.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Regain?

Está indicado en el tratamiento de las alteraciones de la memoria y del comportamiento, debido a:

- Accidente cerebrovascular
- Traumatismo craneoencefálico.

¿En qué casos no debo tomar Regain?

No debe tomar Regain si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a citicolina, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
 - Padece hipertensión del parasimpático (un estado que se manifiesta con tensión arterial baja, sudoración, taquicardia y desmayos).
- No administrar en niños.

¿En qué casos debo tomar Regain con especial cuidado?

Si usted es alérgico al ácido acetilsalicílico, porque puede provocar asma.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Tiene problemas en el hígado.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle, ya que el uso de citicolina no está recomendado durante la lactancia.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Levodopa
- Meclofenoxato

¿Qué dosis debo tomar del producto y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, la dosis recomendada es:

Adultos: de 500 a 2000 mg/día, dependiendo de la gravedad del cuadro a tratar.

¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis?

Sí, si usted padece trastornos de la función hepática, posiblemente su médico le modificará la dosis.

¿Cómo debo tomar Regain?

Los comprimidos de Regain pueden tomarse con o fuera de las comidas.

Regain (gotas): el frasco contiene una tapa a prueba de niños. Para abrirlo proceder de la siguiente manera:

1. Empujar hacia abajo la tapa a rosca y girarla al mismo tiempo en sentido contrario a las agujas del reloj. Retirar la tapa.
 2. Introducir la pipeta dosificadora en el frasco. Sujetar la pipeta dosificadora y aspirar la solución tirando del émbolo lentamente hasta la marca correspondiente al volumen que se desee administrar.
 3. Retirar la pipeta dosificadora del frasco y vaciar el contenido de la misma, deslizando el émbolo hacia abajo. Administrar esa cantidad directamente o mezclada con un poco de agua o jugos.
 4. Cerrar el frasco y enjuagar la pipeta dosificadora con agua luego de cada uso.
- Regain 1000: Se debe disolver el contenido de un sobre en medio vaso de agua (120 ml) y tomar con las comidas o fuera de ellas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Reagin?

Como todos los medicamentos, citicolina puede causar efectos indeseables, los que generalmente son leves y poco frecuentes; incluyen: náuseas, vómitos, dolor de cabeza, vértigo, cambios en la presión arterial, diarrea ocasional, enrojecimiento de la cara. Si se presentan estas reacciones informe a su médico inmediatamente.

¿Cómo debo conservar Reagin?

Reagin 250/500/1000: mantener a una temperatura no superior a 30°C y protegido de la humedad.

Reagin (gotas): mantener a una temperatura no superior a 30°C.

No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Reagin 250

Cada comprimido recubierto ranurado contiene:

Citicolina (como citicolina sódica) 250 mg.

Excipientes: almidón de maíz, lactosa, povidona, talco,

estearato de magnesio, croscarmelosa sódica, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, propilenglicol, laca amarillo de quinolina, laca amarillo ocazo, c.s.p. 1 comprimido.

Reagin 500

Cada comprimido recubierto ranurado contiene:

Citicolina (como citicolina sódica) 500 mg.

Excipientes: almidón de maíz, lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, propilenglicol, povidona, laca amarillo de quinolina, laca azul brillante, c.s.p. 1 comprimido.

Reagin 1000

Cada sobre contiene:

Citicolina (como citicolina sódica) 1000,00 mg.

Excipientes: manitol, povidona, sacarina sódica, rojo punzó soluble, esencia de frambuesa en polvo, c.s.p. 1 sobre.

Reagin (gotas)

Cada ml contiene:

Citicolina (como citicolina sódica) 100,00 mg.

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, ácido sórbico, sacarina sódica, esencia de frambuesa líquida, rojo punzó soluble, agua purificada, c.s.p. 1 ml.

Contenido del envase:

Reagin 250:

Envases conteniendo 20 y 30 comprimidos recubiertos ranurados.



Comprimidos redondos, color amarillo, ranurados.

Reagin 500:

Envases conteniendo 20 comprimidos recubiertos ranurados.



Comprimidos redondos, color verde, ranurados.

Reagin 1000:

Envases conteniendo 10 sobres.



Granulado de color rosa con aroma frutal.

Reagin (gotas):

Frasco conteniendo 30 ml y pipeta dosificadora.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Reagin en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o llamar a ANMAT responde:



0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:



4122-5818

Especialidad medicinal autorizada

por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 35.701

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico

Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires



Última revisión: Agosto de 2016



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires