

# Linprel Multidosis

Pregabalina 75 mg



Expendio bajo receta archivada  
Industria Argentina  
Comprimidos birranurados

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Qué contiene Linprel Multidosis?

Contiene *pregabalina*, una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos denominados antiepilépticos.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Linprel Multidosis?

Linprel Multidosis está indicado para el tratamiento de:

- Dolor neuropático asociado a neuropatía diabética periférica.
- Neuralgia postherpética.
- Adyuvante en pacientes adultos con convulsiones de inicio parcial.
- Fibromialgia.

- Ansiedad generalizada en adultos (según criterios DSM IV).
- Dolor neuropático post-injuria espinal.

### ¿En qué casos no debo tomar Linprel Multidosis?

No debe tomarlo si usted sufre alergia a pregabalina o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Ha tenido un empeoramiento del humor depresivo o se ha sentido intranquilo, ansioso, irritable, agresivo, impulsivo.
- Tiene antecedentes de episodios de angioedema (hinchazón de la cara, boca, labios, lengua, garganta) ó está siendo tratado concomitantemente con otros medicamentos asociados a angioedema (como inhibidores de la ECA: enalapril, lisinopril).
- Se encuentra bajo tratamiento con tiazolidinodinas (como pioglitazona, rosiglitazona).
- Se encuentra bajo tratamiento con medicamentos antiespásticos (como metocarbamol, metaxalona, orfenadrina).
- Se encuentra bajo tratamiento con drogas que potencian el estreñimiento (como analgésicos opiáceos: codeína, fentanilo).
- Padece problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca y arritmias.
- Presenta alteraciones oculares.
- Padece dolor muscular o debilidad, en particular si se acompaña de malestar o fiebre.
- Presenta sangrado o tiene bajo recuento de plaquetas en sangre.
- Presenta problemas renales.
- Usa o ha usado drogas de abuso, o consume o ha consumido en exceso medicamentos con receta médica.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:  
- Rosiglitazona y pioglitazona (hipoglucemiantes orales).  
- Oxycodona.  
- Lorazepam.

### ¿Qué dosis debo tomar de Linprel Multidosis y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, de acuerdo a la indicación, las dosis orientativas son:

Indicación	Dosis inicial	Dosis Máxima
Fibromialgia		450 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Dolor neuropático	150 mg/día (75 mg 2 veces/día o 50 mg 3 veces/día)	Dolor neuropático asociado con neuropatía periférica diabética: 300 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
		Neuralgia post-herpética: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias

Indicación	Dosis inicial	Dosis Máxima
Dolor neuropático		Dolor neuropático post-injuria espinal: 600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias
Pacientes con convulsiones de inicio parcial	150 mg/día (75 mg 2 veces/día o 50 mg 3 veces/día)	600 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias
Trastorno de ansiedad generalizada en adultos		600 mg/día en 2 o 3 tomas diarias

### ¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Linprel Multidosis?

Sí, si usted padece insuficiencia renal moderada o severa, es posible que el médico modifique la dosis.

### ¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Linprel Multidosis?

No es necesario modificar la dosis de Linprel Multidosis si usted padece insuficiencia hepática.

### ¿En pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Linprel Multidosis?

Sí, en pacientes de edad avanzada con función renal disminuida, es probable que el médico modifique la dosis.

### ¿Cómo debo tomar Linprel Multidosis?

La dosis diaria indicada debe administrarse en dos a tres tomas por día, con o sin alimentos.

### ¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Linprel Multidosis?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

**¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Linprel Multidosis?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

**¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Linprel Multidosis mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada de Linprel Multidosis, consulte inmediatamente a su médico. En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del: *Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:* (011) 4962-2247 / 4962-6666 *Hospital Posadas:* (011) 4654-6648 / 4658-7777

**¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Linprel Multidosis?**

Como todos los medicamentos, Linprel Multidosis puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia con pregabalina fueron: mareo, somnolencia, sequedad bucal, edema, visión borrosa, aumento de peso, trastornos en el pensamiento (principalmente dificultad de concentración/atención). Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

**¿Puedo operar maquinarias peligrosas o conducir automóviles durante el inicio del tratamiento con Linprel Multidosis?**

Pregabalina puede causar mareo y somnolencia. Evite realizar estas actividades hasta que usted conozca cómo le afecta Linprel Multidosis.

**¿Puedo consumir alcohol durante el tratamiento con Linprel Multidosis?**

No tome alcohol durante el tratamiento con Linprel Multidosis, ya que puede provocar efectos indeseables.

**¿Cómo debo conservar Linprel Multidosis?**

Debe conservarse a una temperatura no superior a 30°C y protegido de la humedad. No utilice Linprel Multidosis después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

**INFORMACION ADICIONAL**


**Composición:**

Cada comprimido birranurado contiene: Pregabalina 75,0 mg  
Excipientes: Starlac 100 (lactosa monohidrato, almidón de maíz), lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, óxido férrico amarillo, talco, estearato de magnesio, Prosolv HD 90 (celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal), c.s.p. 1 comprimido.

**Contenido del envase:**

**Linprel Multidosis**

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos birranurados.



Comprimidos rectangulares, color amarillo claro, birranurados.

**“Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia médica, y no puede repetirse sin nueva receta médica”**



Este Medicamento es Libre de Gluten

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Linprel Multidosis en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde: ☎ 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica: ☎ 4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 54.589  
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.  
Baliarda S.A.  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Última revisión: Enero 2016

 **Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4208392