

# Ginkan Baliarda

Metronidazol 300 mg  
Miconazol nitrato 100 mg  
Neomicina sulfato 48,8 mg  
Polimixina B sulfato 4,4 mg  
Centella asiática 15 mg



**Baliarda**

Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Óvulos vaginales**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a utilizar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o, si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Qué contiene Ginkan Baliarda?

Contiene:

- *metronidazol*: perteneciente a una clase de medicamentos llamados antimicrobianos.
- *miconazol*: perteneciente a una clase de medicamentos llamados antimicóticos.
- *neomicina / polimixina B*: antibióticos utilizados para prevenir o tratar las infecciones provocadas por bacterias.
- *centella asiática*: con acción cicatrizante, reepitelizante, protectora y revitalizadora dérmica.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Ginkan Baliarda?

El uso de Ginkan Baliarda está indicado para el tratamiento local de las vulvovaginitis específicas e

inespecíficas, particularmente cuando se asocian a lesiones de la pared vaginal; vulvitis, vaginitis, cervicovaginitis irritativas o bacterianas, candidiasis, tricomoniasis, leucorreas de cualquier etiología.

### ¿En qué casos no debo utilizar Ginkan Baliarda?

No debe utilizarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a derivados imidazólicos o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
  - Padece epilepsia u otro problema neurológico.
  - Tiene leucopenia (disminución en el número de glóbulos blancos en la sangre).
  - Tiene una anomalía cuantitativa o cualitativa de cualquiera de los elementos de la sangre (discrasia sanguínea).
  - Se encuentra bajo tratamiento con aminoglucósidos (como amikacina, gentamicina).
  - Presenta problemas hepáticos severos.
- No se debe administrar el producto durante el primer trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Si, usted debe informarle si:

- Tiene síndrome de Cockayne y se encuentra bajo tratamiento concomitante con medicamentos que contienen metronidazol.
- Presenta reacciones alérgicas, vértigo, confusión mental, ataxia (falta de coordinación).

### ¿Debo tener alguna precaución durante el tratamiento con Ginkan Baliarda?

Si, usted debe saber que:

- Deben evitarse las relaciones sexuales vaginales o la utilización de tampones o duchas vaginales durante el tratamiento con el producto.
- El uso de Ginkan Baliarda no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
- La base del óvulo de Ginkan Baliarda puede alterar el látex de preservativos y diafragmas.
- No se debe emplear el producto durante el período menstrual.

- No se debe ingerir por vía oral; el producto es de uso vaginal.

- Se debe utilizar un jabón con pH neutro para la higiene personal.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Si, antes de comenzar el tratamiento con Ginkan Baliarda debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Si, debe informarle si está amamantando.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando algún medicamento?


Si, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante, debido a la posibilidad de una baja absorción del producto que puede afectar la acción y depuración de otros medicamentos y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial, infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como: warfarina, cumarina, fenitoína, 5-fluorouracilo, ciclosporina, busulfán, litio y disulfiram.

### ¿Cómo debo usar Ginkan Baliarda y por cuánto tiempo?


Debe comenzar el tratamiento con 1-2 óvulos diarios. Luego, una vez mejorados los síntomas continuar con 1 óvulo al día, al acostarse.

### ¿Cómo debo aplicar Ginkan Baliarda?

Introducir el óvulo profundamente por vía vaginal.



Retirar el óvulo del envoltorio



Introducir el óvulo profundamente por vía vaginal.

**¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Ginkan Baliarda?**

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

**¿Qué debo hacer si olvido aplicar un óvulo de Ginkan Baliarda?**

Si olvidó usar un óvulo y sólo han pasado unas pocas horas de retraso, úselo inmediatamente.

Si falta poco para la hora de aplicación del siguiente óvulo, no lo utilice entonces. Espere a la siguiente aplicación. No aplique dos óvulos a la vez.

**¿Qué debo hacer si aplico más de un óvulo de Ginkan Baliarda indicado por mi médico?**

Si aplica más de un óvulo de Ginkan Baliarda, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

*Hospital Posadas*

(011) 4654-6648 / 4658-7777

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez*

(011) 4962-2247 / 6666

**¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Ginkan Baliarda?**

Se aconseja no tomar alcohol durante el tratamiento con el producto.

**¿Qué debo hacer si ingiero accidentalmente un óvulo de Ginkan Baliarda?**

Si ingiere accidentalmente un óvulo de Ginkan Baliarda, consulte a su médico.

**¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Ginkan Baliarda?**

Como todos los medicamentos, Ginkan Baliarda puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia, incluyen: sensación de picor y ardor vaginal, prurito, infección vaginal, cervicitis (inflamación

del cuello uterino), disconfort pélvico.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

**¿Cómo debo conservar Ginkan Baliarda?**

Debe conservarse a temperatura entre 15°C y 30°C.

No utilice Ginkan Baliarda después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

**INFORMACION ADICIONAL**

Cada óvulo vaginal contiene:

Metronidazol 300 mg, Miconazol nitrato 100 mg, Neomicina sulfato 48,8 mg, Polimixina B sulfato 4,4 mg, Centella asiática 15 mg.

Excipientes: lactosa, butilhidroxitolueno, Whitepsol H15, c.s.p. 1 óvulo.

**Contenido del envase:**

Envases con 6 y 12 óvulos vaginales.



Óvulos grasos cilíndricos de color crema.



Este Medicamento es Libre de Gluten

*Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Ginkan Baliarda en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)*

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

**4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.815

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Enero 2019



**Baliarda S.A.**  
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires