

# Audipax Multidosis

Betahistina  
diclorhidrato 24 mg



**Baliarda**

Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Comprimidos birranurados**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda **CONSULTE A SU MEDICO**. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, **INFÓRMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO**.

### ¿Qué contiene Audipax Multidosis?

Contiene *betahistina*, un compuesto emparentado con la histamina, que proporciona buenos resultados en el tratamiento de fondo de los trastornos de la circulación laberíntica (del oído interno) y de sus síntomas acompañantes (vértigo, tinnitus -zumbido de oídos-, etc.).

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Audipax Multidosis?

Audipax Multidosis está indicado para tratar:  
- vértigo debido a trastornos circulatorios del oído interno.  
- síndrome de Ménière y síndromes menieriformes (vértigo, tinnitus, pérdida de la audición).

### ¿En qué casos no debo tomar Audipax Multidosis?

No debe tomarlo si usted:

- Sufre alergia a betahistina, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Padece úlcera gástrica o duodenal en fase activa.
- Padece feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal).

Este producto no debe ser administrado en menores de 18 años.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Ha padecido úlcera péptica.
- Tuvo o tiene gastritis.
- Padece asma bronquial.
- Es hipertenso.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si esta amamantando, dado que el uso de Audipax Multidosis no está recomendado durante la lactancia.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmelo si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO), incluyendo subtipo B.



- Antihistamínicos (medicamentos utilizados para tratar la alergia, como: terfenadina, difenhidramina, clorfeniramina).

### ¿Qué dosis de Audipax Multidosis debo tomar y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, la dosis en adultos es de 24 - 48 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias.

Esquema posológico orientativo:

Dosis diaria	Posología
24 mg	
48 mg	
	

Dosis máxima: 1 comprimido 2 veces al día (48 mg/día). La mejoría es gradual, y en algunos pacientes puede notarse luego de un par de semanas.

### ¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Audipax Multidosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

### ¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis de Audipax Multidosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

### ¿En los pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Audipax Multidosis?

No, en los pacientes de edad avanzada con función

renal normal no es necesario modificar la dosis.

### **¿Cómo debo tomar Audipax Multidosis?**

Los comprimidos deben tomarse con un vaso de agua, preferentemente con las comidas.

### **¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Audipax Multidosis ?**

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

### **¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Audipax Multidosis?**

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

### **¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Audipax Multidosis mayor a la indicada por mi médico?**

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:*

*(011) 4962-2247/4962-6666*

*Hospital Posadas:*

*(011) 4654-6648 / 4658-7777*

### **¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Audipax Multidosis?**

Como todos los medicamentos, Audipax Multidosis puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas observadas con betahistina incluyen: náuseas, indigestión, dolor de estómago, reacciones alérgicas, dolor de cabeza, erupción, picazón, urticaria, palpitaciones.

Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

### **¿Cómo debo conservar los comprimidos de Audipax Multidosis?**

Deben conservarse a una temperatura no superior a los 30°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.

No utilice Audipax Multidosis después de su fecha de vencimiento.

### **Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

### **INFORMACION ADICIONAL**

#### **Composición:**

Cada comprimido birranurado contiene:

Betahistina diclorhidrato 24 mg.

Excipientes: manitol, ácido cítrico anhidro, óxido férrico amarillo, dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina PH 200, talco, óxido férrico rojo, óxido férrico pardo, c.s.p. 1 comprimido.

#### **Contenido del envase:**

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos birranurados.



Comprimidos rectangulares, color rosa claro, birranurados.



Este Medicamento es Libre de Gluten

*Para más información puede consultar el prospecto de Audipax Multidosis en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)*

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

 **4122-5818**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.289

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.  
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Octubre 2015



**Baliarda S.A.**

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires