

Balimuc 600

N-Acetilcisteína 600 mg



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Granulado

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.

Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Balimuc 600?

Contiene *N-acetilcisteína*, un derivado del aminoácido natural cisteína que pertenece al grupo de los medicamentos denominados mucolíticos. Se utiliza para fluidificar las secreciones mucosas excesivas y/o espesas.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Balimuc 600?

Está indicado para el tratamiento coadyuvante de las enfermedades respiratorias que cursan con hipersecreción mucosa tales como neumonía, bronquiolitis, bronquiectasias, bronquitis aguda y crónica, bronquitis crónica asmátiforme, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), traqueobronquitis,

tuberculosis, amiloidosis pulmonar primaria, complicaciones pulmonares en la mucoviscidosis.

Está indicado también durante el postoperatorio de intervenciones torácicas y cardiovasculares, atelectasias por taponos mucosos, traumatismo de tórax, exámenes pulmonares de diagnóstico, traqueostomías y en afecciones que presentan secreción mucopurulenta abundante (como sinusitis, faringitis, laringitis, otitis media secretora, pacientes laringectomizados).

¿En qué casos no debo tomar Balimuc 600?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico (hipersensible) a acetilcisteína, a compuestos relacionados con cisteína o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Tiene asma o problemas respiratorios severos.
- Tiene úlcera gastroduodenal.

El producto se encuentra contraindicado en niños menores de 2 años de edad.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Presenta riesgo de hemorragia digestiva (como úlcera péptica, várices esofágicas).
- Presenta broncoespasmo.

No se recomienda la administración de la dosis de 600 mg en niños menores de 14 años, excepto bajo control médico.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:

- Medicamentos utilizados para calmar la tos (antitusivos) e inhibidores de las secreciones bronquiales (como antihistamínicos -loratadina, desloratadina, fexofenadina-, anticolinérgicos -atropina, darifenacina, solifenacina).
- Nitroglicerina.
- Antibióticos (como ampicilina, tetraciclinas -doxiciclina, tetraciclina-, macrólidos -claritromicina, eritromicina-, cefalosporinas -cefalexina, ceftriaxona-, anfotericina B).
- Sales de metales (como aurotiomato de sodio, aurotioglucosa, citrato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de hierro).

¿Qué dosis debo tomar de Balimuc 600 y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

Para su información, las dosis orientativas son:

Adultos y adolescentes a partir de 14 años: 600 mg en una toma, una vez al día.

Dosis máxima: 600 mg/día.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Balimuc 600?

No, no es necesario modificar la dosis si usted padece insuficiencia renal.

¿Cómo debo tomar Balimuc 600?

Se recomienda administrar antes de las comidas.

Disuelva el contenido de un sobre en medio vaso de agua y agite hasta disolución total del granulado.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Balimuc 600?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará cómo proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvidó tomar una dosis de Balimuc 600?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Balimuc 600 mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Balimuc 600?

Como todos los medicamentos, Balimuc 600 puede causar reacciones adversas en algunos pacientes. Las reacciones adversas observadas con el uso de N-acetilcisteína fueron: trastornos gastrointestinales de carácter leve y transitorio (acidez, náuseas, vómitos, diarrea), urticaria, dolor de cabeza, fiebre.

En pacientes predispuestos pueden aparecer reacciones alérgicas que se manifiestan a nivel de la piel y del aparato respiratorio (como broncoespasmo). Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Balimuc 600?

Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. Proteger de la humedad. No utilice el producto después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Cada sobre de Balimuc 600 contiene:

N-Acetilcisteína 600,00 mg

Excipientes: ácido ascórbico, sucralosa, povidona, esencia de ananá en polvo, esencia de mora en polvo, laca azul brillante, manitol, c.s.p. 1 sobre.

Contenido del envase:


Envases conteniendo 10 sobres.




Granulado color celeste, con aroma frutal.

Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Balimuc 600 en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 4122-5818

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 57.350
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires



Este Medicamento
es Libre de Gluten

Ultima revisión: Enero de 2018.



Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires