

Audipax 16

Betahistina



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos ranurados

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguno de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Audipax 16?

Contiene *Betahistina*, un compuesto emparentado con la histamina, que proporciona buenos resultados en el tratamiento de fondo de los trastornos de la circulación laberíntica (del oído interno) y de sus síntomas acompañantes (vértigo, tinnitus -zumbido de oídos-, etc.).

¿En qué pacientes está indicado el uso de Audipax 16?

Audipax 16 está indicado para tratar:
- Vértigo debido a trastornos circulatorios del oído interno.
- Síndrome de Ménière y síndromes menieriformes (vértigo, tinnitus, pérdida de la audición).

¿En qué casos no debo tomar Audipax 16?

No debe tomarlo si Usted:
- Es alérgico (hipersensible) a la betahistina, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").
- Padece úlcera gástrica o duodenal en fase activa.
- Padece feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal).
- Tiene menos de 18 años de edad.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, Usted debe informarle si:
-Ha padecido úlcera péptica.
-Tuvo o tiene gastritis.
-Padece asma bronquial.
-Es hipertenso.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle, ya que el uso de Audipax 16 no está recomendado durante la lactancia.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial informe si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como:
- Inhibidores de la monoamino-oxidasa (MAO), incluyendo subtipo B.
- Antihistamínicos (medicamentos utilizados para tratar las alergias, por ejemplo: terfenadina, difenhidramina, clorfeniramina).

¿Qué dosis de Audipax 16 debo tomar y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado. Para su información, la dosis en adultos es de 24 - 48 mg/día, en 2 o 3 tomas diarias.
Dosis máxima: 48 mg/día.
La mejoría es gradual, y en algunos pacientes puede notarse luego de un par de semanas.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

¿Si padezco problemas de hígado, es necesario modificar la dosis?

No, no es necesario modificar la dosis.

¿En los pacientes ancianos, es necesario modificar la dosis?

No, en los pacientes ancianos con función renal normal no es necesario modificar la dosis.

¿Cómo debo tomar Audipax 16?

Los comprimidos deben ingerirse con un vaso de agua, preferentemente con las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada del producto, consulte a su médico.

En caso de sobredosificación, concurra al hospital más cercano o consulte a los centros toxicológicos de:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-2247 / 4962-6666.
Hospital Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Cuáles son los efectos indeseables que puede ocasionarme el tratamiento con Audipax 16?

Como todos los medicamentos, Audipax 16 puede causar efectos indeseables en algunos pacientes. Los efectos indeseables observados, incluyen: náuseas, indigestión, dolor de estómago, reacciones alérgicas, dolor de cabeza, erupción, picazón, urticaria, palpitaciones.

¿Cómo debo conservar los comprimidos de Audipax 16?

Deben conservarse a una temperatura no superior a los 30°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.
No utilice Audipax 16 después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Cada comprimido ranurado contiene: Betahistina diclorhidrato 16,00 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina PH200, manitol, ácido cítrico anhidro, dióxido de silicio coloidal, talco, óxido férrico amarillo, c.s.p. 1 comprimido.

Contenido del envase:


Envases con 30 comprimidos ranurados.



Comprimidos redondos, color amarillo claro, ranurados, codificados en una cara con isotipo de identificación Baliarda.

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Audipax 16 en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 4122-5818



Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.289
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Última revisión: Octubre 2015



Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires