

Flucoginkan

Fluconazol 150 mg



Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos ranurados

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave, o si tiene cualquier reacción adversa no mencionado en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Flucoginkan?

Contiene una sustancia llamada *fluconazol*, la cual pertenece a un grupo de medicamentos llamados antifúngicos. Se utiliza para tratar infecciones producidas por hongos o para prevenir la aparición de una infección fúngica.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Flucoginkan?

Flucoginkan está indicado para el tratamiento de:

- Candidiasis vaginal aguda o recidivante cuando la terapia local no sea adecuada y, para reducir la candidiasis vaginal recurrente.

- Balanitis por *Cándida* cuando la terapia local no sea apropiada.

- Micosis cutáneas producidas por *Tinea pedis*, *Tinea corporis*, *Tinea cruris*, *Tinea versicolor* e

infecciones cutáneas debido a *Cándida* cuando la terapia sistémica esté indicada. Onicomicosis (por *Tinea unguinum*) cuando los tratamientos de elección no se consideren apropiados.

¿En qué casos no debo tomar Flucoginkan?

No debe tomarlo si usted:

- Es alérgico a fluconazol, otros antifúngicos azólicos o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").

- Se encuentra bajo tratamiento con terfenadina, cisaprida, astemizol, pimizoda, quinidina o eritromicina.

- Está embarazada o amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- Presenta problemas severos en el hígado o en los riñones.

- Padece reacciones alérgicas serias (como anafilaxia).

- Presenta reacciones serias en la piel (como picazón intensa, enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar).

- Padece alguna enfermedad en el corazón o alteraciones del ritmo cardíaco y recibe medicación para tratarlas.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que es-

tá tomando, incluyendo aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante ya que fluconazol puede afectar la acción y depuración de otros medicamentos y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial, infórmele si está bajo tratamiento con: tolbutamida, gliburida, glipizida, warfarina, fenitoína, ciclosporina, rifampicina, teofilina, rifabutina, voriconazol, tacrolimus, midazolam, tiazolam, anticonceptivos orales (que contengan etinilestradiol y levonorgestrel), hidroclorotiazida, alfentanilo, amitriptilina, nortriptilina, carbamazepina, nifedipina, isradipina, amlodipina, felodipina, celecoxib, ciclofosfamida, fentanilo, halofantrina, atorvastatina, simvastatina, fluvastatina, losartán, metadona, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, diclofenac, prednisona, saquinavir, everolimus, sirolimus, vincristina, vinblastina, vitamina A, zidovudina.

¿Qué dosis debo tomar de Flucoginkan y por cuánto tiempo?

Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

La dosis y duración del tratamiento será establecida por su médico en función del tipo y gravedad de la infección.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Flucoginkan?

En caso de tratamientos de dosis únicas, no es necesario modificar la dosis de Flucoginkan.

No obstante, puede que su médico modifique la posología en función de su condición clínica.

¿En los pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Flucoginkan?

No, no es necesario modificar la dosis de Flucoginkan en pacientes de edad avanzada con función renal normal.

¿Cómo debo tomar Flucoginkan?

Los comprimidos deben ingerirse en una única toma diaria, con o fuera de las comidas.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Flucoginkan?

Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que sea casi la hora de su siguiente dosis. En tal caso, no ingiera más que una dosis.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Flucoginkan mayor a la indicada por mi médico?

Si toma más de la cantidad indicada de Flucoginkan, consulte a su médico.

En caso de sobredosis, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

¿Puedo conducir, operar maquinarias pesadas o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Flucoginkan?

Debido a que fluconazol puede producir mareos o convulsiones, evite realizar tareas peligrosas o que requieran completa alerta mental hasta que usted conozca cómo le afecta el producto.

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Flucoginkan?

Como todos los medicamentos, Flucoginkan puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas que se han reportado con mayor frecuencia con fluconazol incluyen: dolor de

cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, resultados elevados en sus análisis para evaluar la función del hígado (elevación de ALT, AST y FAL), erupción.

Si usted presenta alguna de estas reacciones adversas o cualquier otra no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Flucoginkan?

Flucoginkan debe conservarse a una temperatura no mayor de 30°C, preferentemente en su envase original y, proteger de la luz y la humedad.

No utilice Flucoginkan después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Cada comprimido ranurado contiene:

Fluconazol 150,0 mg.

Excipientes: Cellactose 80 (lactosa monohidrato - polvo de celulosa), croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, laca rojo allura.

Contenido del envase:

Flucoginkan:

Envases conteniendo 1, 2 y 4 comprimidos ranurados.




Comprimidos oblongos, ranurados de color rosado.




Este medicamento es Libre de Gluten

Si necesitara mayor información sobre efectos adversos, interacciones con otros medicamentos, contraindicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Flucoginkan en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar>.
asp o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

 4122-5818

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 50.592

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Última revisión: Abril 2018.



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires