Disarval D 5/160/12,5 - 10/160/12,5 - 5/160/25 - 10/160/25 - 10/320/25

Amlodipina 5/10 mg
Valsartán 160/320 mg
Hidroclorotiazida 12,5/25 mg

Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Comprimidos recubiertos

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a tomar el producto, lea detenidamente esta información.
Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO.
Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen su mismo problema, ya que puede perjudicarlas.
Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELA INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

¿Qué contiene Disarval D?
Contiene:
amlodipina, una sustancia perteneciente a la familia de los antagonistas de los canales de calcio; impide que el calcio ingrese en la pared de los vasos sanguíneos, lo que evita el estrechamiento de los mismos.
valsartán, perteneciente a la familia de los antagonistas de los receptores de la angiotensina II; bloquea la acción que ejerce la angiotensina II (hormona que actúa sobre los vasos sanguíneos causando su estrechamiento, lo que provoca un aumento de la presión arterial).
hidroclorotiazida, diurético de la familia de las tiazidas; aumenta la diuresis y con ello la eliminación de agua y sodio, con lo que ayuda a bajar la presión.

¿En qué pacientes está indicado el uso de Disarval D?
Está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial en pacientes adultos que no hayan respondido adecuadamente a la monoterapia con valsartán, amlodipina o hidroclorotiazida.

¿En qué casos no debo tomar Disarval D?
No debe tomarlo si usted:
- Es alérgico (hipersensible) a amlodipina, a las dihidropiridinas, a valsartán, a hidroclorotiazida, a sulfonamidas, o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver “Información adicional”).
- Está cursando el segundo o el tercer trimestre de embarazo.
- Padece problemas graves en el hígado, cirrosis biliar (destrucción de los pequeños conductos biliares de dentro del hígado), colestasis (acumulación de bilis en el hígado).
- Presenta problemas graves en los riñones, presenta anuria (no puede orinar) o se encuentra realizando diálisis.
- Tiene niveles altos de calcio en sangre, o niveles bajos de potasio o de sodio.
- Tiene niveles altos de ácido úrico con inflamación de las articulaciones.
- Presenta una disminución grave de la tensión arterial (hipotensión).
- Padece estenosis aórtica (estrechamiento de la válvula aórtica) o padece insuficiencia cardíaca.
- Padece diabetes mellitus o insuficiencia renal y está bajo tratamiento con aliskiren.
Este producto no debe administrarse en menores de 18 años.

¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?
Sí, usted debe informarle si:
- Ha recibido un tratamiento intensivo con diuréticos, ha realizado una dieta restrictiva en sal o están recibiendo medicamentos como (losartán, telmisartán).
- Presenta síntomas como disnea (falta de aire), fiebre, hipotensión, luego de la toma del producto.
- Padece hiperaldosteronismo primario (sus glándulas no funcionan correctamente, causando retención de agua y sodio).
- Padece lupus eritematoso sistémico (enfermedad autoinmune inflamatoria).
- Tiene antecedentes de alergias y/o reacciones anafilácticas a la penicilina, sulfonamidas o a otro medicamento.
- Ha experimentado hinchazón en cara y garganta (angioedema), experimenta una disminución de la visión o dolor ocular o un aumento de la presión en el ojo.
- Ha tenido cáncer de piel o presenta lesiones sospechosas en la piel.
- Presenta niveles bajos de potasio o magnesio y síntomas como debilidad muscular, espasmos musculares, ritmo anormal del corazón.
- Presenta niveles bajos de sodio en sangre y síntomas como cansancio, confusión, convulsiones.
- Presenta niveles elevados de calcio en sangre y síntomas como náuseas, vómitos, constipación, dolor de estómago, necesidad de orinar con frecuencia, sed, contracciones musculares y debilidad muscular.
- Padece alguna enfermedad cardíaca o coronaria, o ha sufrido un infarto.

¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?
Sí, debe informarle si está embarazada o presume estarlo, como asimismo si planea quedar embarazada.

¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?
Sí, debe informarle que está amamantando.

¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?
Sí, debe informarle todos los medicamentos que está tomando, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. Esto es importante ya que la combinación de amlodipina / valsartán / hidroclorotiazida puede afectar la acción y depuración de otros medicamentos y/o éstos pueden afectar la acción del producto. En especial infórmele si está bajo tratamiento con: simvastatina, ketoconazol, itraconazol, ritonavir, antiepilépticos (como carbamazepina), barbitúricos (como fenobarbital, fenitoína, fosfenitoina, primidona), rifampicina, hierba de San Juan, dantroleno, espironolactona, triamtereno, amilorida, ciclosporina, insulina, antidiabéticos orales (como metformina), resinas de intercambio iónico (como colestiramina, colestipol), drogas narcóticas (como morfina), amantadina, anticolinérgicos (como atropina, biperideno), betabloqueantes (como atenolol, carvedilol, bisoprolol), vasodilatadores (como diazóxido), ciclofosfamida, metotrexato, digitálicos (como amiodarona), productos de contraste yodado, suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio, antidepresivos (como amitriptilina), antipsicóticos (como aripiprazol), antiparkinsonianos (como dopamina), diuréticos (como furosemida), antiarrítmicos (como amiodarona, sotalol, procainamida), medicamentos para el tratamiento de la gota (como probenecid, sulfinpirazina, allopurinol), metildopa, relajantes musculares (como carisoprolol, tubocurarina), bloqueantes de los canales de calcio (como amlodipina, diltiazem), noradrenalina, adrenalina, sales de calcio, vitamina D, litio, antiinflamatorios no esteroides (como ibuprofeno, diclofenac).

¿Qué dosis debo tomar de Disarval D y por cuánto tiempo?
Debe tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le ha indicado.
Como dosis orientativa se recomienda 1 comprimido al día, siempre a la misma hora, preferentemente por la mañana.

¿Si padezco problemas de riñón, es necesario modificar la dosis de Disarval D?
No es necesario modificar la dosis de Disarval D si usted padece de insuficiencia renal de leve a moderada.

¿En los pacientes de edad avanzada, es necesario modificar la dosis de Disarval D?
Sí, es probable que el médico modifique la dosis.

¿Cómo debo tomar Disarval D?
Los comprimidos de Disarval D deben tomarse enteros, con agua, con o fuera de las comidas.

¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Disarval D?
Si usted necesita interrumpir el tratamiento, su médico le indicará como proceder de manera segura.

¿Qué debo hacer si olvido tomar una dosis de Disarval D?
Si usted olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde; en caso de alcanzar el horario de la siguiente toma, no ingiera más que una dosis.

¿Qué debo hacer si tomo una dosis de Disarval D mayor a la indicada por mi médico?
Si toma más de la cantidad indicada de Disarval D, consulte a su médico.
En caso de sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o consultar a los centros toxicológicos del:
Hospital Posadas
(011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez
(011) 4962-2247 / 6666

¿Debo adoptar alguna precaución con alimentos o bebidas durante el tratamiento con Disarval D?
Sí, debe tener precaución con la ingesta de alcohol y jugo de pomelo, ya que su administración durante el tratamiento con Disarval D puede producir un descenso marcado de la presión arterial.

¿Debo adoptar alguna precaución si realizo deportes durante el tratamiento con Disarval D?
Sí, usted debe tener precaución, ya que el tratamiento con Disarval D puede dar resultados positivos en las pruebas de control de doping.

¿Puedo conducir automóviles, operar maquinarias pesadas o realizar tareas peligrosas durante el tratamiento con Disarval D?
Debido a que el uso de amlodipina puede causar mareo, dolor de cabeza, fatiga o náuseas, se recomienda no realizar estas actividades hasta saber cómo le afecta Disarval D.

¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Disarval D?
Como todos los medicamentos, Disarval D puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.
Las reacciones adversas más observadas, incluyen: hipopotasemia (niveles disminuidos de potasio en sangre), mareo, edema, dolor de cabeza, baja tensión sanguínea, palpitaciones, dispepsia (malestar después de comer), polaquiuria (necesidad de orinar muchas veces), fatiga.
Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

¿Cómo debo conservar Disarval D?
Debe conservarse a temperatura entre 15°C y 30°C, preferentemente en su envase original y protegido de la humedad.
No utilice Disarval D después de su fecha de vencimiento.

Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

INFORMACION ADICIONAL

Composición:

Disarval D 5/160/12,5

Cada comprimido recubierto contiene:
Amlodipina (como amlodipina besilato) 5 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 12,50 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol, povidona, óxido férrico amarillo, óxido férrico rojo, óxido férrico pardo, c.s.p. 1 comprimido.

Disarval D 10/160/12,5

Cada comprimido recubierto contiene:
Amlodipina (como amlodipina besilato) 10 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 12,50 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol, povidona, óxido férrico amarillo, óxido férrico rojo, óxido férrico pardo, c.s.p. 1 comprimido.

Disarval D 5/160/25

Cada comprimido recubierto contiene:
Amlodipina (como amlodipina besilato) 5 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 25 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol, povidona, óxido férrico amarillo, c.s.p. 1 comprimido.

Disarval D 10/160/25

Cada comprimido recubierto contiene:
Amlodipina (como amlodipina besilato) 10 mg; Valsartán 160 mg; Hidroclorotiazida 25 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, propilenglicol, polietilenglicol, povidona, óxido férrico amarillo, c.s.p. 1 comprimido.

Disarval D 10/320/25

Cada comprimido recubierto contiene:
Amlodipina (como amlodipina besilato) 10 mg; Valsartán 320 mg; Hidroclorotiazida 25 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, talco, dióxido de silicio coloidal, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol 6000, povidona, óxido férrico amarillo, óxido férrico rojo, óxido férrico pardo, c.s.p. 1 comprimido.

PRESENTACIONES

Disarval D 5/160/12,5:

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos de color marrón claro, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Disarval D 10/160/12,5:

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos de color marrón, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Disarval D 5/160/25:

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos de color amarillo, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Disarval D 10/160/25:

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos de color ocre, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Disarval D 10/320/25:

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos de color marrón, codificados en una cara con la inscripción M y con isotipo de identificación Baliarda en la otra.

Para más información puede consultar el prospecto de Disarval D en la página web de Baliarda: www.baliarda.com.ar

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llamar a ANMAT responde:
0800-333-1234

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 57.501
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Abril 2025

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4209559