

# Ginclin

Clindamicina 100 mg  
Ketoconazol 400 mg



**Baliarda**

Expendio bajo receta  
Industria Argentina  
**Ovulos vaginales**

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

Antes de comenzar a utilizar el producto, lea detenidamente esta información.

Si tiene alguna duda CONSULTE A SU MEDICO. Este medicamento ha sido indicado sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas, aún si poseen los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.

Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o, si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, INFORMELO INMEDIATAMENTE A SU MEDICO.

### ¿Qué contiene Ginclin?

Contiene:

- *clindamicina*: una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos tipo lincosamida.

- *ketoconazol*: una sustancia que pertenece a una clase de medicamentos llamados imidazoles antifúngicos.

### ¿En qué pacientes está indicado el uso de Ginclin?

El uso de Ginclin está indicado para el tratamiento local (vaginal) de vaginosis bacteriana, vaginitis debida a infecciones mixtas, vaginitis inespecíficas y candidiasis.

### ¿En qué casos no debo utilizar Ginclin?

No debe utilizarlo si usted:

- es alérgico a clindamicina y/o a ketoconazol o a cualquiera de los demás componentes del producto (ver "Información adicional").

- padece enteritis regional, colitis ulcerosa o antecedentes de colitis asociada con antibióticos.

### ¿Debo informarle a mi médico si padezco algún otro problema de salud?

Sí, usted debe informarle si:

- presenta diarrea o habitualmente presenta diarrea cuando toma antibióticos.

- si aparece irritación vaginal, o sensación de picazón, ardor intenso y doloroso vaginal.

### ¿Debo tener alguna precaución durante el tratamiento con Ginclin?

Si, usted debe saber que:

- deben evitarse las relaciones sexuales vaginales, o la utilización de tampones o duchas vaginales durante el tratamiento con Ginclin.

- el uso de Ginclin no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

- la base del óvulo de Ginclin puede alterar el látex de preservativos y diafragmas.

- no debe emplear Ginclin durante el período menstrual.

- Ginclin es de uso exclusivo por vía vaginal. No debe ingerirse.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy embarazada o podría estarlo?

Si. Antes de comenzar el tratamiento con Ginclin debe informarle si está embarazada, presume estarlo o si planea quedar embarazada.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy amamantando?

Sí, debe informarle si está amamantando.

### ¿Debo informarle a mi médico si estoy tomando otros medicamentos?

Sí, debe informarle todos los medicamentos que está

tomando, incluyendo todos aquellos de venta libre, vitaminas o suplementos dietarios. En especial infórmele si está bajo tratamiento con ciertos medicamentos como bloqueantes neuromusculares (como vecuronio, succinilcolina, galamina).



### ¿Cómo usar Ginclin y por cuánto tiempo?

Debe utilizar Ginclin como y durante el tiempo que su médico le ha indicado.

El tratamiento habitual consiste en aplicar un óvulo, una vez al día, preferentemente al acostarse, durante 7 días consecutivos.

### ¿Cómo debo aplicar Ginclin?

Recostada sobre su espalda, introducir el óvulo profundamente por vía vaginal.



### ¿Qué debo hacer si necesito interrumpir el tratamiento con Ginclin?

Si usted necesita interrumpir el tratamiento con Ginclin, su médico le indicará como proceder de manera segura.

### ¿Qué debo hacer si olvidó aplicar un óvulo de Ginclin?

Si olvidó usar un óvulo y sólo han pasado unas pocas horas del horario de aplicación, úselo inmediatamente.

Si falta poco para el horario de aplicación de su siguiente óvulo, no lo utilice entonces. Espere a la siguiente aplicación. No aplique dos óvulos a la vez.

### ¿Qué debo hacer si aplico más de un óvulo de Ginclin indicado por mi médico?

Si aplica más de un óvulo de Ginclin, consulte a su médico. En caso de sobredosisificación, concurrir al hospital más

cercano o consultar a los centros toxicológicos de:

Hospital Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-2247 / 6666

### **¿Qué debo hacer si ingiero accidentalmente un óvulo de Ginclin?**

Si ingiere accidentalmente un óvulo de Ginclin, consulte a su médico.

### **¿Cuáles son las reacciones adversas que puede ocasionarme el tratamiento con Ginclin?**

Como todos los medicamentos, Ginclin puede causar reacciones adversas en algunos pacientes.

Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia con clindamicina incluyen: infección vaginal, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas, picazón, inflamación o dolor en la zona de la vulva o de la vagina.

Las reacciones adversas que se han observado con mayor frecuencia con ketoconazol incluyen: sensación de picazón y ardor vaginal e irritación en la zona de aplicación. Si usted presenta cualquier otra reacción adversa no mencionada aquí, consulte a su médico.

### **¿Cómo debo conservar Ginclin?**

Debe conservarse a temperatura entre 15°C y 30°C.

No utilice Ginclin después de su fecha de vencimiento.

**Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.**

## **INFORMACION ADICIONAL**

### **Composición:**

Cada óvulo vaginal contiene:

Clindamicina (como fosfato) 100,00 mg, Ketoconazol 400,00 mg.

Excipientes: Glicéridos semisintéticos sólidos c.s.p 1 óvulo.

### **Contenido del envase:**


Envases conteniendo 7 óvulos vaginales.




Óvulos grasos cilíndricos de color crema.

*Si necesitara mayor información sobre reacciones adversas, interacciones con otros medicamentos, contra-indicaciones, precauciones o cualquier otro aspecto, podrá consultar el prospecto de Ginclin en la página web de Baliarda: [www.baliarda.com.ar](http://www.baliarda.com.ar)*

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde:

 0800-333-1234

**Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a [farmacovigilancia@baliarda.com.ar](mailto:farmacovigilancia@baliarda.com.ar) o con nuestro centro de atención telefónica:**

 **4122-5818**



Este Medicamento es Libre de Gluten

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.536

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

Ultima revisión: Diciembre 2017



**Baliarda S.A.**

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires