

Condiar

Extracto total de insaponificables
de Palta y Soja 300 mg
Persea gratissima / Glycine max



Baliarda

Expendio bajo receta
Industria Argentina
Cápsulas blandas

FORMULA:

Cada cápsula blanda contiene:
Extracto total de insaponificables de palta y soja 300 mg
(aceite de insaponificable de palta -fruto de Persea gratissima / aceite de insaponificable de soja -semilla de Glycine max).
Excipientes: aceite de soja, c.s.p. 1 cápsula blanda.
Composición de la cascarrilla de gelatina: gelatina, glicerina, rojo allura, amarillo de quinoleína, dióxido de titanio en glicerina (1:1,5), agua purificada.

ACCION TERAPEUTICA:

Antiinflamatorio y antirreumático, no esteroide.
Actúa sobre el trofismo del tejido conectivo.
(Código ATC: M01AX26)

INDICACIONES:

- Está indicado en adultos, para:
- el tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis (artrosis) de cadera y rodilla.
 - el tratamiento adyuvante de la periodontitis.

CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS / PROPIEDADES:

ACCION FARMACOLOGICA

La osteoartritis (OA) es un trastorno progresivo caracterizado por la destrucción del cartilago articular y el hueso subcondral asociado a cambios sinoviales. Esta afección degenerativa afecta generalmente a hombres y mujeres mayores. Las articulaciones más afectadas por el dolor y la discapacidad física en adultos son la cadera y la rodilla. La alteración de la homeostasis del cartilago, sea por envejecimiento, predisposición genética, trauma o trastorno metabólico, induce modificaciones fenotípicas profundas de los condrocitos, promoviendo la síntesis de un subconjunto de factores que producen daño al cartilago y a otros tejidos articulares. Entre estos factores se encuentran numerosos

componentes de las vías inflamatorias. Los condrocitos producen citoquinas, implicadas en las respuestas inflamatorias y de estrés en las articulaciones con OA.

Los insaponificables de palta y soja (IPS) son utilizados en pacientes con osteoartritis para la reducción del dolor y la rigidez, y para mejorar la función articular. Los IPS son extractos naturales compuestos por vitaminas liposolubles, fitoesteres, tocoferoles, alcoholes triterpénicos y ácidos grasos. Los componentes más importantes de los IPS son los fitoesteres (β -sitosterol, campesterol y stigmasterol); a estos se debe principalmente la actividad biológica de los IPS en los condrocitos. En el caso del stigmasterol, éste inhibe varios mediadores proinflamatorios y de la degradación de la matriz (la metaloproteínasa), implicados en la degradación del cartilago inducida por la OA. Los fitoesteres en general, se consideran potentes agentes antiinflamatorios, con actividad analgésica. Estos esteroides, son rápidamente incorporados en las células produciendo un incremento del estatus antioxidante celular. Los IPS poseen propiedades condroprotectoras, anabólicas y anticatabólicas; inhiben la ruptura del cartilago, promueven la reparación del mismo e inhiben diferentes moléculas y vías implicadas en la OA. Además, actúan como potentes inhibidores de las citoquinas. Manifiestan sus propiedades anabólicas al promover la reparación del cartilago mediante la estimulación de la síntesis de colágeno y a través de la inhibición de citoquinas inflamatorias como la interleucina (IL-1 β), el factor de necrosis tumoral (TNF- α), la COX2 (ciclooxigenasa 2) y la óxido nítrico sintetasa, con la consiguiente disminución de la PGE-2 y del óxido nítrico, respectivamente.

Los efectos condroprotectores están mediados por la corrección de las anomalías del factor de crecimiento, del aumento del TGF- β y de la disminución del factor de crecimiento endotelial vascular en el líquido sinovial.

Los IPS estimulan la producción de colágeno, inhiben la absorción de colesterol y la biosíntesis endógena de colesterol.

FARMACOCINETICA

La absorción intestinal de los fitoesteres es entre un 4-5% para el β -sitosterol y el stigmasterol y 9-15% para el campesterol. Luego de la administración oral, la t_{max} se alcanza de 15-72 horas, sugiriendo una absorción lenta pero continua desde el tracto gastrointestinal hacia la circulación sistémica. Los incrementos observados en el ABC de los tres esteroides a las dosis administradas, fueron menores a las esperadas para una relación de tipo lineal, lo que sugiere propiedades farmacocinéticas no lineales. Los incrementos observados en la C_{max} también fueron no lineales.

En estudios con ratas alimentadas con β -sitosterol radiomarcado, se observó que las concentraciones más altas de fitoesterol se encontraron en tejidos como la corteza adrenal, ovarios, testículos e hígado.

La biodisponibilidad oral absoluta de β -sitosterol radiomarcado reportada en humanos es de 0,41%.

La eliminación se produce principalmente por las heces.

POSOLOGIA Y MODO DE ADMINISTRACION:

La dosis habitual es de una cápsula por día.

Modo de administración:

Las cápsulas se deben administrar con abundante agua, junto con alguna de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al extracto de insaponificables de palta y soja o a cualquiera de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

Poblaciones especiales:

Embarazo y lactancia: no existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico o fetotóxico. Por lo tanto, no está recomendada su administración durante el embarazo ni la lactancia.

Población pediátrica: se aconseja no usar, dado que no hay datos suficientes que avalen la seguridad en menores de 18 años.

Población de edad avanzada: no hay datos clínicos suficientes en este grupo etario.

Insuficiencia hepática: si el paciente padece alguna enfermedad hepática o de la vesícula biliar y, al iniciar el tratamiento aparecen signos o síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga, pérdida de apetito, ictericia, coluria, se recomienda interrumpir el tratamiento y realizar una evaluación médica inmediatamente.

Interacciones medicamentosas:

No se han descripto interacciones riesgosas.

Anticoagulantes: con el uso concomitante con anticoagulantes, se han reportado trastornos hemorrágicos, máculas eritematosas en la piel, hematomas o hematomas espontáneos y sangrado de las membranas mucosas. Por lo tanto, si aparecen cualquiera de estos signos, se debe interrumpir el tratamiento y realizar una evaluación médica inmediatamente.

REACCIONES ADVERSAS:

Las reacciones adversas reportadas con mayor frecuencia, fueron: diarrea, dolor abdominal, molestias en la parte superior del abdomen, náuseas.

Poco frecuentes: reacciones alérgicas graves (como picazón, urticaria, erupción/enrojecimiento de la piel, inflamación del rostro, dificultad respiratoria), trastornos hepáticos como ictericia, aumento de las enzimas hepáticas (como transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma glutamil transpeptidasa).

Raras: erupción intensa de la piel.

Otras reacciones adversas reportadas, fueron:

Poco frecuentes: acidez, gusto desagradable en la boca (que puede evitarse tomando la cápsula junto con la comida), dolor abdominal, acolia, cefalea, coluria, debilidad, cansancio, mastodinia, mastitis, ginecorragia.

Raras: trastornos gastrointestinales; inflamación intestinal, vómitos, sequedad bucal, eructos, eccema, cálculos renales, trastornos de la coagulación (como plaquetopenia), hipertensión arterial.

SOBREDOSIFICACION:

Las sobredosis pueden provocar o exacerbar trastornos gastrointestinales y/o hepáticos.

No se han descripto hasta el momento casos de sobredosis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de: *Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:*

(011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas:

(011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACION:

Envases conteniendo 30 cápsulas blandas.



Cápsulas blandas ovales de color naranja, conteniendo un líquido turbio de color marrón claro.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONSERVACION:

Mantener a temperatura ambiente no superior a 25°C.

Proteger de la humedad.

Medicamento herbario autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 60331

Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.

Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Elaborado en calle Canelones esq. Puente del Inca, Lote 35, Carlos Spegazzini, Polo industrial Ezeiza, Buenos Aires

Todo tratamiento exige un control periódico, debiendo consultarse al médico ante la menor duda o reacción adversa del medicamento. Siguiendo los criterios de la OMS se aconseja no administrar medicamentos durante el primer trimestre del embarazo y aún durante todo el transcurso del mismo, excepto cuando sean indicados por el médico. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.



Última revisión: Febrero 2025



Baliarda S.A.

Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

7000267