Alertial 120

FEXOFENADINA CLORHIDRATO
120 mg

Baliarda

Venta Libre
Industria Argentina

Vía de administración: ORAL
Comprimidos recubiertos

INFORMACION PARA EL PACIENTE

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguna de las reacciones adversas que sufre es grave o si tiene cualquier reacción adversa no mencionada en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿Qué contiene Alertial 120?
Cada comprimido recubierto contiene:
Ingrediente activo: Fexofenadina clorhidrato 120 mg.
Ingredientes inactivos (excipientes): almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, dióxido de titanio, propilenglicol, polietilenglicol 6000, povidona, laca azul brillante.

Acción:
Antialérgico no sedativo.

¿Para qué se usa Alertial 120?
Se utiliza en adultos y adolescentes a partir de 16 años, para aliviar los síntomas:
- asociados a rinitis alérgica (como estornudos, picazón de ojos y/o nariz, secreción nasal, congestión nasal, enrojecimiento y lagrimeo de ojos).
- de picazón (prurito), ronchas de la piel y sarpullidos.

¿Qué personas no pueden recibir Alertial 120?
No tome este medicamento si usted tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

¿Qué cuidados debe tener antes de tomar Alertial 120?
Si usted tiene problemas en el hígado o en los riñones consulte a su médico antes de tomarlo.
Si usted tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares, podría aumentar el riesgo de latidos rápidos e irregulares.
Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o amamantando a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
Efectos sobre la capacidad de conducir: es poco probable que los comprimidos de Alertial 120 afecten su capacidad para conducir o utilizar maquinaria. Sin embargo, deberá comprobar que Alertial 120 no le produzcan sueño o mareo al momento de conducir o utilizar maquinaria.

¿Qué cuidados debe tener mientras está tomando Alertial 120?
Al igual que todos los medicamentos, Alertial 120 puede producir reacciones adversas.
Consulte con su médico inmediatamente y deje de tomar Alertial 120 si nota que:
- se le hincha la cara, los labios, la lengua o la garganta y tiene dificultad para respirar (pueden ser síntomas de una reacción alérgica).

Reacciones adversas frecuentes:
- Dolor de cabeza.
- Somnolencia.
- Sensación de malestar (náuseas).
- Mareo.

Reacciones adversas poco frecuentes:
- Cansancio.

Otras reacciones adversas que pueden ocurrir:
- Dificultad para dormir (insomnio).
- Trastornos del sueño.
- Pesadillas.

- Nerviosismo.
- Latido del corazón rápido o irregular.
- Diarrea.
- Erupción en la piel y picazón.
- Urticaria.
- Reacciones alérgicas graves que pueden manifestarse como inflamación de la cara, labios, lengua o garganta, sofoco, opresión en el pecho, y dificultad para respirar.

Si usted toma al mismo tiempo medicamentos para la indigestión que contienen aluminio y magnesio, estos pueden afectar la acción de Alertial 120 disminuyendo la cantidad de medicamento absorbido.

Se recomienda dejar un intervalo de unas 2 horas entre la toma de Alertial 120 y la del medicamento para la indigestión.

SI LOS SINTOMAS DE RINITIS PERSISTEN POR MAS DE 7 DIAS O EMPEORAN, CONSULTE A SU MEDICO.

¿Cómo se usa Alertial 120?

Adultos y adolescentes a partir de 16 años: la dosis recomendada es 120 mg/día (1 comprimido por día), antes de las comidas, con agua.

No se ha determinado su uso para menores de 16 años.

Si olvidó tomar Alertial 120, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la siguiente dosis a la hora habitual indicada por su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACION CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández:
(011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿Tiene usted alguna pregunta?

Si lo desea, puede comunicarse con Baliarda S.A. vía email a farmacovigilancia@baliarda.com.ar o con nuestro centro de atención telefónica:

4122-5818

También puede llamar a ANMAT RESPONDE:

0800-333-1234

PRESENTACION

Alertial 120:

Envases conteniendo 10 comprimidos recubiertos.

Comprimidos oblongos ranurados de color celeste con el isotipo de identificación Baliarda en una cara y la inscripción “ALERTIAL” en la otra.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Mantener a temperatura no superior a 30ºC.
Proteger de la humedad.

Especialidad medicinal autorizada
por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 54.736
Director Técnico: Alejandro Herrmann, Farmacéutico.
Baliarda S.A. Saavedra 1260/62 - Buenos Aires.

Ultima revisión: Enero de 2025

Baliarda S.A.
Saavedra 1260/62 - Buenos Aires

4209481